СЕПТИЛИН ПЛЮС

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки круглые двояковыпуклые без оболочки, зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

	1 таб.
Порошки:	
коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы)	324 мг
шанкх бхасма (смола)	64 мг
сухой экстракт из сбора растительного сырья*	368 мг
Махараснади кват** (многокомпонентная растительная смесь) 35 %; тиноспоры сердцелистной стеблей 27 %; марены сердцелистной корней 17 %; эмблики лекарственной плодов 9 %; моринги крылатосеменной листьев 9 %; солодки голой корней 3 %. * В качестве экстрагента для приготовления экстракта из сбора растительного сырья используется вода. Соотношение сбор : экстракт сухой - 5:1. ** В состав многокомпонентной растительной смеси "Махараснади кват" входят: терминалии чебули околоплодники, терминалии беллерики околоплодники, эмблики лекарственной плоды, фагонии критской целое растение, сиды сердцелистной целое растение, клещевины обыкновенной целое растение, кедра гималайского древесина, гедихия колоскового корневища, адатоды настоящей корни, имбиря лекарственного корневища, перца явского длинного стебли, сыти круглой корневища, берхавии раскидистой корни, тиноспоры сердцелистной стебли, ипомеи пальчатой корни, укропа индийского плоды, якорцев стелющихся плоды, витании снотворной корни, кассии дудчатой мякоть плода, спаржи кистевидной корневые клубни, перца длинного плоды, барлерии пильчатой целое растение, кориандра посевного целое растение, паслена желтоплодного целое растение, паслена индийского целое растение.	

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 57 мг, кросповидон 43 мг, кармеллоза натрия 11 мг, кремния диоксид коллоидный 5 мг, магния стеарат 3 мг.

60 шт. - флаконы пластиковые (1) из полиэтилена высокой плотности - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Септилин Плюс обладает противовоспалительным действием. Входящие в состав препарата действующие активные вещества растений (биофлавоноиды и дубильные вещества) способствуют уменьшению проявлений воспалительного процесса, снижают проницаемость капилляров, проявляют антиэкссудативное действие. Наличие полисахаридов в составе препарата способствует стимуляции фагоцитоза, за счет повышения фагоцитарной активности гранулоцитов и макрофагов, и ускорению хемотаксиса полиморфно-ядерных лейкоцитов в очаге инфекции. Препарат Септилин Плюс усиливает гуморальный иммунный ответ, способствует повышению неспецифической резистентности организма. Применение препарата способствует купированию клинических признаков острого воспаления верхних дыхательных путей. Препарат оказывает противовоспалительный эффект одновременно на слизистую оболочку носоглотки, глотки и небных миндалин.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике многокомпонентного растительного препарата Септилин Плюс в лекарственной форме таблетки отсутствуют. Активность препарата обусловлена взаимно усиливающим сочетанным действием его компонентов, что характерно для растительных лекарственных средств. Поскольку активность препарата нельзя полностью отнести за счет какого-либо одного соединения, фармакокинетические исследования многокомпонентных растительных препаратов, н том числе Септилин Плюс, неосуществимы.

Показания к применению:

— риносинусит (острый, обострение хронического);

— обострение хронического тонзиллофарингита.

Относится к болезням:

- Тонзиллит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата;

— возраст до 18 лет.

С осторожностью: у пациентов с заболеваниями ЖКТ.

Способ применения и дозы:

Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания, лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача.

В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае, если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, ощущение сухости во рту, диспепсические явления (тошнота, диарея, метеоризм), абдоминальные боли, транзиторное повышение активности «печеночных» траисаминаз.

Передозировка:

Данные о передозировке отсутствуют. В случае передозировки применяется симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. При необходимости применения в период грудного вскармливания, грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата не исключает возможность применения других лекарственных средств, в том числе антибактериальных препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

При прекращении приема препарата Септилин Плюс в лекарственной форме таблетки о возникновении синдрома «отмены» не сообщалось. Специальных мер при пропуске одной или нескольких доз препарата не требуется. В случае, если пациент один или несколько раз пропускает прием лекарственного средства, следует продолжать прием препарата по рекомендованной в инструкции схеме, не удваивая дозы. Специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного средства не требуется.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

О влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера/оператора и другое) не сообщалось.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/SEPTILIN_PLYuS