

[СИГИДА кристалл](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафазолин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капли глазные 0.05%** в виде прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой жидкости.

	1 мл
нафазолина нитрат	0.5 мг

Вспомогательные вещества: борная кислота - 18.7 мг, макрогол 300 - 1.125 мг, натрия гиалуронат - 1 мг, динатрия эдетата дигидрат (трилон Б) - 0.5 мг, натрия гидроксида раствор 1 М - до pH4.0-7.0, вода д/и - до 1 мл.

0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (2) - пачки картонные.
0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (4) - пачки картонные.
0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (6) - пачки картонные.
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (1) - пачки картонные.
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (2) - пачки картонные.
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие.

Показания к применению:

Острый ринит, сенной насморк, острый и хронический ларингит, острый евстахиит, аллергический и связанный с облучением отек гортани, гиперемия слизистых оболочек после операций в верхних дыхательных путях, хронические конъюнктивиты, астенопические расстройства, как дополнительное средство - при конъюнктивитах бактериального происхождения, при лечении уролитиаза, в комбинации с местными анестетиками (при противопоказаниях для применения адреналина).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Астенопия](#)
- [Гиперемия слизистых оболочек](#)
- [Евстахиит](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Насморк](#)
- [Отек гортани](#)
- [Ринит](#)
- [Сенной насморк](#)
- [Уролителиаз](#)

Противопоказания:

Детский возраст до 1 года, артериальная гипертензия, гипертиреозидизм, повышенная чувствительность к нафазолину, выраженный атеросклероз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после окончания их применения.

Способ применения и дозы:

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Местные реакции: раздражение слизистой оболочки (в зависимости от места применения); при применении более 1 недели - отек слизистой оболочки, атрофический ринит.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: реактивная гиперемия, тахикардия, повышение АД.

Со стороны ЦНС: головная боль.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение нафазолина при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только по строгим показаниям в тех случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять одновременно с ингибиторами MAO или в течение 14 дней после окончания их применения.

Нафазолин замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аденома предстательной железы
- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз

Источник: http://drugs.thead.ru/SIGIDA_kristall