Саб симплекс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Симетикон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суспензия для приема внутрь*** от белого до серо-белого цвета, слегка вязкая, с характерным фруктовым (ванильно-малиновым) запахом.

	100 мл
симетикон	6.919 г
(диметикон 350 : кремния диоксид, в соотношении 92.5% : 7.5%)	

Вспомогательные вещества: гипромеллоза - 1.5 г, карбомер - 0.6 г, натрия цитрата дигидрат - 1 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.5468 г, ароматизатор ванильный - 0.315 г, ароматизатор малиновый - 0.108 г, натрия цикламат - 0.2 г, натрия сахаринат - 0.02 г, натрия бензоат - 0.1 г, эфиры полигликостеариловой кислоты - 1.0378 г, сорбиновая кислота - 0.0347 г, вода - 89.6189 г.

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (25 капель в 1 мл) (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, уменьшающий метеоризм. Симетикон уменьшает поверхностное натяжение пузырьков газа, образующихся в содержимом желудка и слизи кишечника, и вызывает их разрушение. Высвобождающиеся при этом газы всасываются стенкой кишечника или удаляются при перистальтике кишечника.

При УЗИ и рентгенографии предупреждает помехи и перекрытия изображений; способствует лучшему орошению слизистой оболочки толстой кишки контрастным средством, препятствуя разрыву контрастной пленки.

Симетикон удаляет пену физическим путем, не вступает в химические реакции.

Фармакокинетика

Вследствие физической и химической инертности не всасывается в организме. После прохождения через ЖКТ выводится в неизмененном виде.

Показания к применению:

— в качестве симптоматической терапии при повышенном газообразовании, метеоризме (в т.ч. в послеоперационном периоде);

— подготовка к диагностическим исследованиям ЖКТ (рентгенография, УЗИ, эзофагогастродуоденоскопия);

— острые отравления моющими средствами при их попадании в желудок.

Относится к болезням:

- Метеоризм
- Эзофагит

Противопоказания:

— обструктивные заболевания ЖКТ;

— кишечная непроходимость;

— повышенная чувствительность к симетикону или любому из вспомогательных компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь.

Повышенное газообразование

Новорожденным и детям грудного возраста (до 1 года), находящимся на искусственном вскармливании, добавляют по 15 капель (0.6 мл) суспензии в каждую бутылочку с детским питанием. Препарат хорошо смешивается с другими жидкостями (в т.ч. с молоком). Саб Симплекс можно давать новорожденным перед кормлением с чайной ложки.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет назначают по 15 капель (0.6 мл) во время или после еды, и при необходимости дополнительно по 15 капель на ночь.

Детям в возрасте от 6 до 15 лет назначают 20-30 капель (0.8-0.12 мл), **взрослым** – 30-45 капель (1.2-1.8 мл). Разовую дозу принимают каждые 4-6 ч. При необходимости возможно повышение разовой дозы.

Саб Симплекс лучше всего принимать во время или после еды и, при необходимости, перед сном.

Длительность применения зависит от динамики жалоб. При необходимости возможна длительная терапия.

Перед применением следует активно встряхнуть флакон. Чтобы суспензия начала поступать из пипетки флакон следует перевернуть вверх дном и постучать по дну.

Подготовка к диагностическим исследованиям ЖКТ

Применение при подготовке к диагностическим исследованиям ЖКТ облегчается, если с флакона удалить пипетку.

Для *подготовки к рентгенографии* за день до исследования вечером следует принять 3-6 чайных ложек (15-30 мл) препарата Саб Симплекс.

Для *подготовки к УЗИ* рекомендуют принять 3 чайные ложки (15 мл) вечером за день до исследования и 3 чайные ложки за 3 ч до исследования.

Перед *эндоскопией* следует принять 0.5-1 чайную ложку (2.5-5 мл) и во время исследования через эндоскоп ввести дополнительно несколько миллилитров суспензии препарата.

Отравление моющими средствами

Доза препарата Саб Симплекс зависит от тяжести отравления. Минимальная рекомендованная доза составляет 1 чайную ложку (5 мл).

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Саб Симплекс не известны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Саб Симплекс не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Саб Симплекс можно применять у больных сахарным диабетом, т.к. препарат не содержит углеводов.

Новые и/или повторяющиеся жалобы, связанные с усиленным газообразованием должны быть клинически подтверждены.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Возможно применение у детей по показаниям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sab_simpleks