

Сагенит



Код АТХ:

- [G02CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
дикалиевая соль мезо-3,4-ди (пара-сульфобензил)-гексана	100 мг
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.	
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр, не оказывая эстрогенного действия на органы-мишени; усиливает сокращения матки; повышает плацентарный кровоток; способствует увеличению концентрации в крови бета-липопротеинов, повышению чувствительности тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

Показания к применению:

— климактерический синдром (проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек - ломкостью ногтей, истончением кожи, образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

Относится к болезням:

- [Климактерический синдром](#)

Противопоказания:

— метроррагия;

— повышенная чувствительность к препарату

С *осторожностью*: почечная недостаточность, нарушение функции печени, гиперлипотеинемия.

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь, независимо от времени приема пищи, при *климактерических расстройствах* у женщин по 1 капсуле/сут. Суточная доза - до 2 капсул/сут. Курс лечения - 30-40 дней.

Побочное действие:

В редких случаях возможны тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции (сыпь, отек век), метроррагия, холестатическая желтуха.

Передозировка:

Симптомы: метроррагия, геморрагический шок.

Лечение: отмена препарата, гемотрансфузия, парентеральное введение кровезаменителей.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие диуретических, антиаритмических, гипотензивных препаратов, антикоагулянтов.

Ослабляет эффекты мужских половых гормонов.

Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении Сагенита пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 капсула содержит 0.05 г сахарозы.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью*: почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью*: нарушение функции печени.

Применение в детском возрасте

У детей не применяется.

Условия хранения:

Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sagenit>