Сагенит



Код АТХ:

- G02CX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы	**1 капс.**
дикалиевая соль мезо-3,4-ди (пара-сульфофенил)-гексана	100 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр, не оказывая эстрогенного действия на органы-мишени; усиливает сокращения матки; повышает плацентарный кровоток; способствует увеличению концентрации в крови бета-липопротеинов, повышению чувствительности тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

Показания к применению:

— климактерический синдром (проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек - ломкостью ногтей, истончением кожи, образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

Относится к болезням:

- Климактерический синдром

Противопоказания:

— метроррагия;

— повышенная чувствительность к препарату

С *осторожностью:* почечная недостаточность, нарушение функции печени, гиперлипопротеинемия.

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь, независимо от времени приема пищи, при *климактерических расстройствах* у женщин по 1 капсуле/сут. Суточная доза - до 2 капсул/сут. Курс лечения - 30-40 дней.

Побочное действие:

В редких случаях возможны тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции (сыпь, отек век), метроррагия, холестатическая желтуха.

Передозировка:

Симптомы: метроррагия, геморрагический шок.

Лечение: отмена препарата, гемотрансфузия, парентеральное введение кровезаменителей.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации не применяется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие диуретических, антиаритмических, гипотензивных препаратов, антикоагулянтов.

Ослабляет эффекты мужских половых гормонов.

Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении Сагенита пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 капсула содержит 0.05 г сахарозы.

При нарушениях функции почек

С *осторожностью:* почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью:* нарушение функции печени.

Применение в детском возрасте

У детей не применяется.

Условия хранения:

Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sagenit