## Сагенит



## Код АТХ:

• G02CX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$  Википедия $^{\mathrm{MHH}}$  РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$ 

## Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
дикалиевая соль мезо-3,4-ди (пара-сульфофенил)-гексана	100 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

# Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

#### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр, не оказывая эстрогенного действия на органы-мишени; усиливает сокращения матки; повышает плацентарный кровоток; способствует увеличению концентрации в крови бета-липопротеинов, повышению чувствительности тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

# Показания к применению:

— климактерический синдром (проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек - ломкостью ногтей, истончением кожи, образованием морщин, дистрофией слизистой мочеполовых путей).

#### Относится к болезням:

• Климактерический синдром

#### Противопоказания:

- метроррагия;
- повышенная чувствительность к препарату

С осторожностью: почечная недостаточность, нарушение функции печени, гиперлипопротеинемия.

### Способ применения и дозы:

Принимать внутрь, независимо от времени приема пищи, при *климактерических расстройствах* у женщин по 1 капсуле/сут. Суточная доза - до 2 капсул/сут. Курс лечения - 30-40 дней.

### Побочное действие:

В редких случаях возможны тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции (сыпь, отек век), метроррагия, холестатическая желтуха.

## Передозировка:

Симптомы: метроррагия, геморрагический шок.

Лечение: отмена препарата, гемотрансфузия, парентеральное введение кровезаменителей.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации не применяется.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие диуретических, антиаритмических, гипотензивных препаратов, антикоагулянтов.

Ослабляет эффекты мужских половых гормонов.

Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита.

# Особые указания и меры предосторожности:

При назначении Сагенита пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что 1 капсула содержит 0.05 г сахарозы.

#### При нарушениях функции почек

С осторожностью: почечная недостаточность.

#### При нарушениях функции печени

С осторожностью: нарушение функции печени.

#### Применение в детском возрасте

У детей не применяется.

# Условия хранения:

Список Б. В сухом месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять после истечения срока годности.

# Срок годности:

3 года.

# Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sagenit