

[Сагенит \(таблетки\)](#)



Код АТХ:

- [G02CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические.

	1 таб.
мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат (сигетин)	100 мг

Вспомогательные вещества: крахмал, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоклиматерический препарат. Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в

Сагенит (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр. Не оказывает эстрогенного действия на органы-мишени. Усиливает сокращения матки, повышает плацентарный кровоток. Способствует увеличению в крови концентрации бета-липопротеинов, повышает чувствительность тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Сагенит не предоставлены.

Показания к применению:

— климактерический синдром, проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек (ломкость ногтей, истончение кожи, образование морщин, дистрофия слизистой оболочки мочеполовых путей).

Относится к болезням:

- [Климактерический синдром](#)

Противопоказания:

- метроррагия;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности, нарушениях функции печени, гиперлипопротеинемии.

Способ применения и дозы:

При *климактерическом синдроме* Сагенит назначают внутрь по 1 таб. независимо от приема пищи. Суточная доза - до 2 таб. Курс лечения - 30-40 дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, холестатическая желтуха.

Со стороны ЦНС: редко - головокружение.

Со стороны половой системы: редко - метроррагия.

Аллергические реакции: редко - сыпь, отек век.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Сагенит не применяют при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита.

Сагенит усиливает действие диуретиков, антикоагулянтов, антиаритмических, гипотензивных препаратов.

Сагенит (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Ослабляет эффекты препаратов мужских половых гормонов.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

С осторожностью следует назначать препарат при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

С осторожностью следует назначать препарат при нарушениях функции печени.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sagenit_tabletki