Сагенит (таблетки)



Код АТХ:

- G02CX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мезодиэтилэтилендибензолсульфонат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические.

	1 таб.
мезодиэтилэтилендибензолсульфоната дикалия дигидрат (сигетин)	100 мг

Вспомогательные вещества: крахмал, стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоклимактерический препарат. Участвует в реализации положительной и отрицательной обратной связи в

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, оказывает стабилизирующее действие на гонадотропную функцию гипофиза и гипоталамический центр. Не оказывает эстрогенного действия на органы-мишени. Усиливает сокращения матки, повышает плацентарный кровоток. Способствует увеличению в крови концентрации бета-липопротеинов, повышает чувствительность тканей к действию инсулина и утилизации глюкозы.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Сагенит не предоставлены.

Показания к применению:

— климактерический синдром, проявляющийся приливами, повышенным потоотделением, нарушениями сна, раздражительностью, депрессией, забывчивостью, дегенеративными изменениями кожи и слизистых оболочек (ломкость ногтей, истончение кожи, образование морщин, дистрофия слизистой оболочки мочеполовых путей).

Относится к болезням:

- Климактерический синдром

Противопоказания:

— метроррагия;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности, нарушениях функции печени, гиперлипопротеинемии.

Способ применения и дозы:

При *климактерическом синдроме* Сагенит назначают внутрь по 1 таб. независимо от приема пищи. Суточная доза - до 2 таб. Курс лечения - 30-40 дней.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, холестатическая желтуха.

Со стороны ЦНС: редко - головокружение.

Со стороны половой системы: редко - метроррагия.

Аллергические реакции: редко - сыпь, отек век.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Сагенит не применяют при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фолиевая кислота и препараты щитовидной железы повышают эффективность Сагенита.

Сагенит усиливает действие диуретиков, антикоагулянтов, антиаритмических, гипотензивных препаратов.

Ослабляет эффекты препаратов мужских половых гормонов.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

С *осторожностью* следует назначать препарат при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушениях функции печени.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sagenit_tabletki