# Сальгим

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Раствор для ингаляций 0.1%*** | **1 мл** |
|---|---|
| сальбутамола гемисукцинат | 1 мг |

2.5 мл - флаконы (10) - пачки картонные.
5 мл - флаконы (10) - пачки картонные.
10 мл - флаконы (10) - пачки картонные.
50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Препарат относится к группе селективных агонистов $\beta_2$-адренергических рецепторов, взаимодействуя с $\beta_2$-адренорецепторами бронхов.

Сальгим расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, тормозит развитие бронхоспазма. Обладает незначительным влиянием на сердечно-сосудистую систему. Практически не оказывает побочного хронотропного эффекта.

## Показания к применению:

— для купирования приступов удушья при бронхиальной астме и для профилактики и лечения обратимой бронхиальной обструкции, включая хронический обструктивный бронхит и другие заболевания органов дыхания.

## Относится к болезням:

- Бронхит
- Удушье

## Противопоказания:

— I и II триместр беременности;

— сочетанное применение с бета-адреноблокаторами, например, с пропранололом;

— признаки аллергии на сальбутамол или его производные.

Следует применять с *осторожностью* у пациентов, страдающих тиреотоксикозом, сахарным диабетом, аритмиями и в период лактации.

## Способ применения и дозы:

Раствор ингалируется только через небулайзер. Небулайзер превращает раствор в аэрозоль для ингаляции. Перед применением препарата необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации небулайзера:

1. Подготовьте небулайзер для использования.

2. Поместите раствор Сальгима в небулайзер.

Не следует разбавлять раствор и/или смешивать с другими препаратами.

3. После окончания ингаляции удалите оставшийся раствор и вымойте небулайзер.

При использовании Сальгима через небулайзер, начальная доза препарата составляет 2.5 мг каждые 4-6 ч в течение первых 24-48 ч терапии или до стабилизации клинической картины. Улучшение состояния наблюдается после ингаляции обычно через 10-15 мин.

При *тяжелом обострении хронической обструктивной болезни легких* кратность введения Сальгима может быть значительно увеличена - возможно назначение препарата каждые 30-60 мин до достижения клинического эффекта.

## Побочное действие:

Сальгим может вызывать тремор у некоторых пациентов, чаще всего рук. Этот эффект аналогичен таковому при использовании различных лекарственных форм сальбутамола.

Ряд пациентов могут ощущать беспокойство, нервное напряжение в результате стимуляции рецепторов скелетной мускулатуры.

Возможно снижение АД и незначительное компенсаторное увеличение ЧСС. Возможно появление головной боли, гипокалиемии и пародоксального бронхоспазма.

## Передозировка:

*Симптомы:* тахикардия, слабость, снижение АД, мышечный тремор.

*Неотложная помощь при передозировке:* симптоматическая терапия, введение кардиоселективных бета-адреноблокаторов.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: I и II триместр беременности.

Следует применять с *осторожностью* в период лактации.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сальгим хорошо сочетается с противоастматическими препаратами других фармакотерапевтических групп (ГКС, мембраностабилизаторы, антигистаминные, отхаркивающие средства, муколитики, холиноблокаторы, ксантины).

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат назначается с осторожностью пациентам с тахиаритмией и другими нарушениями ритма, миокардитом, пороками сердца (в т.ч. аортальным стенозом), артериальной гипертонией, острой сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, тиреотоксикозом, глаукомой.

## Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света месте при температуре в интервале от 5 до 25°С. Вскрытый флакон хранить не более суток в холодильнике. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности **-** 2 года. Не использовать после даты указанной на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Salgim