Сальгим (таблетки)



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки	**1 таб.**
сальбутамола гемисукцинат	4 мг

50 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сальгим является высокоэффективным стимулятором β_2-адренергических рецепторов. Обладает выраженным бронходилатирующим действием, предупреждает и купирует бронхоспазм, снижает сопротивление в дыхательных путях, увеличивает жизненную емкость легких.

Предотвращает выделение гистамина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии из тучных клеток. Препарат среднепродолжительного действия.

Бронхорасширяющий эффект проявляется уже в течение первого часа после приема препарата, продолжительность действия составляет 4-5 ч.

В терапевтических дозах препарат практически не оказывает хронотропного и инотропного эффектов. Входящая в состав Сальгима янтарная кислота обладает антигипоксическим свойством.

При курсовом применении препарат способен надежно контролировать течение бронхиальной астмы преимущественно легкой степени тяжести, а в комбинации с препаратами других фармакологических групп – средней степени тяжести.

Показания к применению:

— предупреждение приступов удушья;

— бронхиальная астма;

— профилактика лечения обратимой бронхиальной обструкции, включая хронический обструктивный бронхит и другие заболевания органов дыхания.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхит
- Удушье

Противопоказания:

— I и II триместр беременности;

— угроза выкидыша;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Сальгим применяют по назначению врача. Как правило, принимают по одной таблетке 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

Применение Сальгима в *редких случаях* может вызвать чувство внутреннего беспокойства и слабовыраженный тремор скелетной мускулатуры, головную боль, тошноту, рвоту, артериальную гипотензию, коллапс, сердцебиение, нарушение сна, парадоксальный бронхоспазм, кожную сыпь.

Передозировка:

Симптомы: тахикардия, слабость, снижение АД, мышечный тремор.

Неотложная помощь при передозировке: промывание желудка, симптоматическая терапия, введение кардиоселективных бета-адреноблокаторов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I и II триместре беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Сальгим хорошо сочетается с противоастматическими препаратами других фармакологических групп (глюкокортикостероидные гормоны, метаболизаторы, антигистаминные, отхаркивающие средства, муколитики, холинолитики, ксантины).

Препарат не назначают одновременно с пропранололом.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат назначается с осторожностью пациентам с тахикардией и другими нарушениями ритма, миокардитом, пороками сердца (в т.ч. аортальным стенозом), артериальной гипертензией, острой сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, тиреотоксизмом, глаукомой.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности **-** 5 лет. Не использовать после даты указанной на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Salgim_tabletki