Салициловая кислота



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Салициловая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения спиртовой 1%***	**1 л**
салициловая кислота	10 г

Вспомогательные вещества: этанол 70%.

25 мл - флаконы темного стекла.
40 мл - флаконы темного стекла.

◊ ***Раствор для наружного применения спиртовой 2%***	**1 л**
салициловая кислота	20 г

Вспомогательные вещества: этанол 70%.

25 мл - флаконы темного стекла.
40 мл - флаконы темного стекла.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает кератолитическое, антисептическое, местнораздражающее и противовоспалительное действие. Подавляет секрецию сальных и потовых желез.

Показания к применению:

Обыкновенные угри, жирная себорея, хроническая экзема.

Относится к болезням:

- Себорея
- Угри
- Экзема

Противопоказания:

Гиперчувствительность, почечная недостаточность; детский возраст; беременность и период лактации.

Способ применения и дозы:

Наружно. Препарат наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в сут. Максимальная суточная доза для взрослых - 10 мл (соответствует 0.2 г салициловой кислоты). Курс лечения - не более 1 недели.

Побочное действие:

Возможна индивидуальная непереносимость, аллергические реакции; местные реакции (жжение, зуд, гиперемия).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для наружного применения и тем самым усилить их всасывание. Всосавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических лекарственных средств, производных сульфонилмочевины. Раствор фармацевтически несовместим с Резорцином (Резорцинол&) (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (нерастворимый цинка салицилат).

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует наносить препарат на родимые пятна, бородавки, бородавки в области гениталий или лица.

При попадании на слизистые оболочки необходимо промыть соответствующую область большим количеством воды.

При нарушениях функции почек

Противопоказано: почечная недостаточность.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 10°С до 18°С. Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности. 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Salicilovaya_kislota