

Салициловой Кислоты Раствор Спиртовой



Код АТХ:

- [D01AE12](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Салициловая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для наружного применения. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие. Обладает слабой противомикробной активностью.

Показания к применению:

Жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли.

Относится к болезням:

- [Бородавки](#)
- [Ихтиоз](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Угри](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, детский возраст.

Способ применения и дозы:

Наносят на пораженную поверхность 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: местные реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фармацевтически несовместима с резорцином (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (образует нерастворимый цинка салицилат).

Особые указания и меры предосторожности:

В состав раствора для наружного применения входит этанол.

Применение в детском возрасте

Противопоказана в детском возрасте.

Источник: http://drugs.thead.ru/Salicilovoy_Kisloty_Rastvor_Spirtovoy