

## Салициловой Кислоты Раствор Спиртовой



### **Код АТХ:**

- [D01AE12](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Салициловая кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство для наружного применения. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие. Обладает слабой противомикробной активностью.

### **Показания к применению:**

Жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли.

### **Относится к болезням:**

- [Бородавки](#)
- [Ихтиоз](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Угри](#)
- [Экзема](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, детский возраст.

### **Способ применения и дозы:**

Наносят на пораженную поверхность 2-3 раза/сут.

### **Побочное действие:**

*Редко:* местные реакции в виде зуда, жжения, кожной сыпи, аллергические реакции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Фармацевтически несовместима с резорцином (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (образует нерастворимый цинка салицилат).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В состав раствора для наружного применения входит этанол.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказана в детском возрасте.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Salicilovoy\\_kisloty\\_rastvor\\_spirtovoy](http://drugs.thead.ru/Salicilovoy_kisloty_rastvor_spirtovoy)