Сальтос



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия	**1 таб.**
сальбутамола гемисукцинат	7.23 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

По механизму действия является избирательным стимулятором β_2-адренергических рецепторов. Препарат расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, предотвращает развитие бронхоспазма и восстанавливает дыхание на фоне развившегося бронхоспазма. Обладает более продолжительным действием по сравнению с сальбутамолом.

Терапевтический эффект сохраняется в течение 12-14 ч.

Фармакокинетика

$T_{1/2}$ - 24 ч. Выводится почками.

Показания к применению:

— профилактика и лечение обратимой бронхообструкции всех типов, включая бронхиальную астму, хронический обструктивный бронхит, эмфизему легких.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Эмфизема легких

Противопоказания:

— тяжелая сердечная недостаточность;

— некоторые нарушения ритма (пароксизмальная тахикардия, политопная желудочковая экстрасистолия и др.);

— заболевания почек и печени с нарушением их функции;

— беременность.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют по назначению врача. Как правило, принимают по 1 таб. (7.23 мг) 1 раз/сут во второй половине дня. Таблетку проглатывают целиком, не разжевывая. По назначению врача суточная доза может увеличена до 2-3 таб./сут, в этом случае первый прием назначают утром, а последующие с интервалами 12 или 8 ч соответственно.

Таблетки с поврежденной оболочкой или разломанные не пригодны к применению.

Побочное действие:

При повышении дозы до 2 таб. и более возможно появление тремора, особенно рук, тахикардии. О появлении этих признаков необходимо сообщить лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказано: заболевания почек с нарушением их функции.

При нарушениях функции печени

Противопоказано: заболевания печени с нарушением функции.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Срок годности - 4 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Saltos