### Сальтос



### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой пролонгированного действия	1 таб.
сальбутамола гемисукцинат	7.23 мг

<sup>10</sup> шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

По механизму действия является избирательным стимулятором  $\beta_2$ -адренергических рецепторов. Препарат расслабляет гладкую мускулатуру бронхов, предотвращает развитие бронхоспазма и восстанавливает дыхание на фоне развившегося бронхоспазма. Обладает более продолжительным действием по сравнению с сальбутамолом.

Терапевтический эффект сохраняется в течение 12-14 ч.

#### Фармакокинетика

 $T_{1/2}$  - 24 ч. Выводится почками.

## Показания к применению:

— профилактика и лечение обратимой бронхообструкции всех типов, включая бронхиальную астму, хронический обструктивный бронхит, эмфизему легких.

#### Относится к болезням:

- Бронхит
- Эмфизема легких

## Противопоказания:

— тяжелая сердечная недостаточность;

<sup>30</sup> шт. - банки пластиковые (1) - пачки картонные.

- некоторые нарушения ритма (пароксизмальная тахикардия, политопная желудочковая экстрасистолия и др.);
- заболевания почек и печени с нарушением их функции;
- беременность.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют по назначению врача. Как правило, принимают по 1 таб. (7.23 мг) 1 раз/сут во второй половине дня. Таблетку проглатывают целиком, не разжевывая. По назначению врача суточная доза может увеличена до 2-3 таб./сут, в этом случае первый прием назначают утром, а последующие с интервалами 12 или 8 ч соответственно.

Таблетки с поврежденной оболочкой или разломанные не пригодны к применению.

## Побочное действие:

При повышении дозы до 2 таб. и более возможно появление тремора, особенно рук, тахикардии. О появлении этих признаков необходимо сообщить лечащему врачу.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности.

## Особые указания и меры предосторожности:

#### При нарушениях функции почек

Противопоказано: заболевания почек с нарушением их функции.

#### При нарушениях функции печени

Противопоказано: заболевания печени с нарушением функции.

### Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при комнатной температуре. Срок годности - 4 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

# Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Saltos