Сальвин-ВИФ

Код АТХ:

- D08AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Шалфея лекарственного листьев экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Содержит эфирные масла (основные компоненты - альфа-туйон, бета-туйон, 1,8-цинеол, камфора, борнеол, изобутил ацетат, камфен, линалоол, альфа- и бета-пинен, виридифлорол, альфа- и бета-кариофиллен); кофеиновую кислоту и ее производные (розмариновая кислота, хлорогеновая кислота); дитерпены (главные компоненты - карносоловая кислота, розманол, саффисинолид); флавоноиды (включая апигенин- и лютеолин-7-глюкозиды, ряд метоксилированных агликонов, в т.ч. генкванин, генкванин-6-метиловый эфир; тритерпены (главный компонент - урсоликовая кислота).

Шалфей оказывает антибактериальное, фунгистатическое, вирусостатическое, вяжущее, секретолитическое действие, способствует уменьшению потоотделения.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта, глотки, гортани.

Противопоказания:

При применении рекомендуемым способом не выявлены.

Способ применения и дозы:

Приготовленный настой (10 г сырья на 200 мл воды) используют в виде полоскания.

Побочное действие:

При применении рекомендуемым способом не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности.

С осторожностью применять в период грудного вскармливания, т.к. шалфей может подавлять лактацию.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется применять при беременности.

С осторожностью применять в период грудного вскармливания, т.к. шалфей может подавлять лактацию.

Источник: http://drugs.thead.ru/Salvin-VIF