

## [\*\*Сангвиритрин линимент 0,5%\*\*](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Сангвинарина гидросульфат](#)
- [Хелеритрина гидросульфат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр МНН](#) [МНН Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Обладает широким спектром противомикробного действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Enterococcus* spp., *Shigella* spp., *Escherichia* spp., *Salmonella* spp., *Proteus* spp., *Acinetobacter* spp., *Citrobacter* spp., *Pseudomonas* spp., *Serratia* spp., *Klebsiella* spp., *Antracoides* spp., *Cryptococcus* spp.), патогенных грибов рода *Microsporum*, *Trichophyton*, *Nocardia*, *Aspergillus*, дрожжеподобных грибов рода *Candida* (в т.ч. полирезистентные штаммы микроорганизмов), а также *Actinomyces* и некоторые патогенных простейших (*Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis*). В основе механизма противомикробного действия сангвиритрина лежит подавление бактериальной нуклеазы, нарушение процессов проницаемости клеточных стенок, перегородок деления, строения нуклеоида.

Активен в отношении многих полирезистентных штаммов микроорганизмов.

Обладает антихолинэстеразной активностью.

### **Показания к применению:**

В комплексной терапии острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваний:

- острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсициоинфекции);
- раневые инфекции и различные инфекционные осложнения, обусловленные патогенной микрофлорой (реконвалесцентное бактерионосительство);
- заболевания, связанные с нарушением нормальной микрофлоры (дисбактериозы), а также заболевания, вызванные патогенными грибами (фарингомикоз, кандидоз, микроспория).

В составе комбинированной терапии чувствительных и двигательных нарушений, связанных с заболеваниями и травматическими повреждениями нервной системы (полиомиелит, детский церебральный паралич).

Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний кожи у новорожденных и раневой инфекции у хирургических больных; инфекционно-воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек (в т.ч. инфицированные раны, пародонтит, пародонтоз, альвеолярная пиорея, язвенно-некротический гингивостоматит, афтозный стоматит);

тонзиллит, отит; пиодермия, экзема, дерматомикоз, онихомикоз, поверхностный бластомикоз; открытые инфицированные переломы, ожоги, длительно незаживающие раны и трофические язвы.

Заболевания среднего уха и наружного слухового прохода.

Инфекционно-воспалительные заболевания матки и влагалища (эндоцервицит, кольпит, вульвит, эрозия шейки матки, инфицированные послеоперационные раны), в т.ч. у беременных женщин.

## Относится к болезням:

- [Альвеолит](#)
- [Вульвит](#)
- [Гингивит](#)
- [Дерматит](#)
- [Детский церебральный паралич](#)
- [Дизентерия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Ожоги](#)
- [Отит](#)
- [Паралич](#)
- [Пародонтит](#)
- [Полиомиелит](#)
- [Раны](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Стоматит](#)
- [Токсикоз](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Трофические язвы](#)
- [Фарингит](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- эпилепсия;
- гиперкинезы;
- бронхиальная астма;
- стенокардия;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- грибковые поражения кожи с явлениями экзематизации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Внутрь** (не разжевывая), после приема пищи.

**Взрослым** обычно назначают по 10 мг 3-4 раза/сут (при необходимости суточная доза может быть повышена до 45 мг). **Детям 11-15 лет** назначают 5-10 мг 3 раза/сут (максимальная суточная доза - 30 мг); **4-10 лет** - по 5 мг 3-4 раза/сут (максимальная суточная доза - 20 мг); **1-3 лет** - по 5 мг на каждый год жизни (максимальные дозы: 1 год - 5 мг/сут, 2 года - по 5 мг 1-2 раза/сут, 3 года - по 5 мг 2-3 раза/сут). Продолжительность курса лечения зависит от нозологической формы и тяжести заболевания и в среднем составляет: при острых кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсиционы) - 5-7 дней (при необходимости до 10 дней); при дисбактериозах - до 10-14 дней; при бактерионосительстве (бактериовыделении) - 7-14 дней; при фарингомикозе и кандидозе - до 14 дней; при микроспории - 4-5 нед.

## Наружно

При **поверхностном** бластомикозе смазывают очаги поражения линиментом ежедневно 1-2 раза/сут в течение 4-7 дней; для лечения **длительно незаживающих ран и язв** линимент накладывают на раневую поверхность при перевязках ежедневно или через 1-2 дня.

**Местно**

При стоматитах проводят аппликацию линимента на пораженные участки слизистой оболочки полости рта 2-3 раза/сут в течение 2-5 дней.

При лечении наружного отита после очистки слухового прохода вводят турунды, смоченные 0.2% спиртовым раствором Сангвиритрина на 10-15 мин 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения - не менее 2 недель.

При хроническом гнойном среднем отите после тщательного туалета среднего уха закапывают 0.2% спиртовой раствор по 5-8 капель 3 раза/сут.

При гноино-воспалительных заболеваниях кожи у новорожденных 0.2% водно-спиртовым раствором смачивают кожные складки 2 раза/сут в течение первых 5-6 дней жизни.

При лечении открытых инфицированных переломов используют 0.01-0.1% водный раствор.

В гинекологии используют примочки 0.005-0.01% теплого водного раствора 1-2 раза/сут в течение 5-10 дней.

При стоматитах проводят аппликацию 0.2% спиртового раствора 2-3 раза/сут в течение 2-5 дней.

При пародонтитах используют турундочки, смоченные 0.2% водно-спиртовым или 0.01-0.1% водным раствором.

Максимальная суточная доза у **взрослых и детей старше 5 лет**: водно-спиртовые растворы - 15 мл, водные растворы - 30 мл; у **детей до 5 лет** - водно-спиртовые растворы - 10 мл, водные растворы - 20 мл.

Лечение альвеолярной пиореи (пародонтоз) осуществляется врачом-стоматологом в соответствии с инструкцией.

**Побочное действие:**

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, жжение, болезненность (в месте нанесения препарата).

**Особые указания и меры предосторожности:**

Таблетки используются для приготовления водного раствора.

Жжение и болезненность при использовании раствора или линимента можно устраниТЬ добавлением 0.5% раствора прокайнa.

Для уменьшения побочного действия рекомендуется назначать после еды, вместе с сахаром или сиропом.

**При нарушениях функции почек**

Противопоказан при почечной недостаточности.

**При нарушениях функции печени**

Противопоказан при печеночной недостаточности.

**Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Sangviritrin\\_liniment\\_05](http://drugs.thead.ru/Sangviritrin_liniment_05)