

[Сангвиритрин линимент 0,5%](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Сангвинарина гидросульфат](#)
- [Хелеритрина гидросульфат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Линимент	100 г
сангвиритрин (сангвинарина гидросульфат + хелеритрина гидросульфат)	0.5 г

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
20 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает широким спектром противомикробного действия. *Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерии* (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Shigella spp.*, *Escherichia spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Acinetobacter spp.*, *Citrobacter spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Serratia spp.*, *Klebsiella spp.*, *Antracoides spp.*, *Cryptococcus spp.*), патогенных грибов рода *Microsporium*, *Trichophyton*, *Nocardia*, *Aspergillus*, дрожжеподобных грибов рода *Candida* (в т.ч. полирезистентные штаммы микроорганизмов), а также *Actinomyces* и некоторые патогенных простейших (*Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis*). В основе механизма противомикробного действия сангвиритрина лежит подавление бактериальной нуклеазы, нарушение процессов проницаемости клеточных стенок, перегоронок деления, строения нуклеоида.

Активен в отношении многих полирезистентных штаммов микроорганизмов.

Обладает антихолинэстеразной активностью.

Показания к применению:

В комплексной терапии острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваний:

— острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);

Сангвиритрин линимент 0,5%

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— раневые инфекции и различные инфекционные осложнения, обусловленные патогенной микрофлорой (реконвалесцентное бактерионосительство);

— заболевания, связанные с нарушением нормальной микрофлоры (дисбактериозы), а также заболевания, вызванные патогенными грибами (фарингомикоз, кандидоз, микроспория).

В составе комбинированной терапии чувствительных и двигательных нарушений, связанных с заболеваниями и травматическими повреждениями нервной системы (полиомиелит, детский церебральный паралич).

Профилактика гнойно-воспалительных заболеваний кожи у новорожденных и раневой инфекции у хирургических больных; инфекционно-воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек (в т.ч. инфицированные раны, пародонтит, пародонтоз, альвеолярная пиорея, язвенно-некротический гингивостоматит, афтозный стоматит); тонзиллит, отит; пиодермия, экзема, дерматомикоз, онихомикоз, поверхностный blastomycosis; открытые инфицированные переломы, ожоги, длительно незаживающие раны и трофические язвы.

Заболевания среднего уха и наружного слухового прохода.

Инфекционно-воспалительные заболевания матки и влагалища (эндоцервицит, кольпит, вульвит, эрозия шейки матки, инфицированные послеоперационные раны), в т.ч. у беременных женщин.

Относится к болезням:

- [Альвеолит](#)
- [Вульвит](#)
- [Гингивит](#)
- [Дерматит](#)
- [Детский церебральный паралич](#)
- [Дизентерия](#)
- [Дисбактериоз](#)
- [Инфекции](#)
- [Кольпит](#)
- [Ожоги](#)
- [Отит](#)
- [Паралич](#)
- [Пародонтит](#)
- [Полиомиелит](#)
- [Раны](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Стоматит](#)
- [Токсикоз](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Травмы](#)
- [Трофические язвы](#)
- [Фарингит](#)
- [Экзема](#)
- [Эрозия шейки матки](#)

Противопоказания:

- эпилепсия;
- гиперкинезы;
- бронхиальная астма;
- стенокардия;
- печеночная и/или почечная недостаточность;
- грибковые поражения кожи с явлениями экзематизации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь (не разжевывая), после приема пищи.

Взрослым обычно назначают по 10 мг 3-4 раза/сут (при необходимости суточная доза может быть повышена до 45

Сангвиритрин линимент 0,5%

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

мг). **Детям 11-15 лет** назначают 5-10 мг 3 раза/сут (максимальная суточная доза - 30 мг); **4-10 лет** - по 5 мг 3-4 раза/сут (максимальная суточная доза - 20 мг); **1-3 лет** - по 5 мг на каждый год жизни (максимальные дозы: 1 год - 5 мг/сут, 2 года - по 5 мг 1-2 раза/сут, 3 года - по 5 мг 2-3 раза/сут). Продолжительность курса лечения зависит от нозологической формы и тяжести заболевания и в среднем составляет: при острых кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции) - 5-7 дней (при необходимости до 10 дней); при дисбактериозах - до 10-14 дней; при бактерионосительстве (бактериовыделении) - 7-14 дней; при фарингомикозе и кандидозе - до 14 дней; при микроспории - 4-5 нед.

Наружно

При *поверхностном бластомикозе* смазывают очаги поражения линиментом ежедневно 1-2 раза/сут в течение 4-7 дней; для *лечения длительно незаживающих ран и язв* линимент накладывают на раневую поверхность при перевязках ежедневно или через 1-2 дня.

Местно

При *стоматитах* проводят аппликацию линимента на пораженные участки слизистой оболочки полости рта 2-3 раза/сут в течение 2-5 дней.

При *лечении наружного отита* после очистки слухового прохода вводят турунды, смоченные 0.2% спиртовым раствором Сангвиритрина на 10-15 мин 2-3 раза/сут. Продолжительность лечения - не менее 2 недель.

При *хроническом гнойном среднем отите* после тщательного туалета среднего уха закапывают 0.2% спиртовой раствор по 5-8 капель 3 раза/сут.

При *гнойно-воспалительных заболеваниях кожи у новорожденных* 0.2% водно-спиртовым раствором смачивают кожные складки 2 раза/сут в течение первых 5-6 дней жизни.

При *лечении открытых инфицированных переломов* используют 0.01-0.1% водный раствор.

В *гинекологии* используют примочки 0.005-0.01% теплого водного раствора 1-2 раза/сут в течение 5-10 дней.

При *стоматитах* проводят аппликацию 0.2% спиртового раствора 2-3 раза/сут в течение 2-5 дней.

При *пародонтитах* используют турундочки, смоченные 0.2% водно-спиртовым или 0.01-0.1% водным раствором.

Максимальная суточная доза у **взрослых и детей старше 5 лет**: водно-спиртовые растворы - 15 мл, водные растворы - 30 мл; у **детей до 5 лет** - водно-спиртовые растворы - 10 мл, водные растворы - 20 мл.

Лечение альвеолярной пиорреи (пародонтоз) осуществляется врачом-стоматологом в соответствии с инструкцией.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Аллергические реакции: зуд, гиперемия кожи, жжение, болезненность (в месте нанесения препарата).

Особые указания и меры предосторожности:

Таблетки используются для приготовления водного раствора.

Жжение и болезненность при использовании раствора или линимента можно устранить добавлением 0.5% раствора прокаина.

Для уменьшения побочного действия рекомендуется назначать после еды, вместе с сахаром или сиропом.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sangviritrin_liniment_05_0