Сангвиритрин (таблетки)



Код АТХ:

- A07AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Сангвинарина гидросульфат
- Хелеритрина гидросульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** от темно-оранжевого до коричневато-оранжевого цвета, круглой формы с двояковыпуклыми поверхностями.

	1 таб.
сангвиритрин (сангвинарина гидросульфат и хелеритрина гидросульфат)	5 мг

Вспомогательные вещества: сахароза (сахар или сахар-рафинад), повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700), магния стеарат.

Состав оболочки: опадрай II белый OY-LS-28911 (гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), лактозы моногидрат, полидекстроза, полиэтиленгликоль 4000 (макрогол-4000), краситель титана диоксид), акрилиз белый 93O18359 (сополимер метакриловой кислоты с этилакрилатом 1:1, краситель титана диоксид, тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия гидрокарбонат, натрия лаурилсульфат), опадрай II красный 85F25163 (гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), лактозы моногидрат или полидекстроза, полиэтиленгликоль 4000 (макрогол-4000), краситель железа оксид красный (E172)).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат с противомикробным действием. Сангвиритрин получают из травы маклейи сердцевидной (Macleaya cordata) и маклейи мелкоплодной (Macleaya microcarpa) семейства маковых (Papaveraceae). Сангвиритрин представляет собой смесь бисульфатов двух близких по структуре и свойствам четвертичных бензофенантридиновых алкалоидов сангвинарина и хелеритрина.

Сангвиритрин обладает широким спектром противомикробной активности, действуя на *грамположительные и грамотрицательные бактерии* (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Escherichia spp., Salmonella spp., Proteus spp., Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., Serratia spp., Klebsiella spp., Antracoides spp., Cryptococcus spp.), *патогенные грибы* рода Microsporum, Trichophyton, Nocardia, Aspergillus, дрожжеподобные грибы рода Candida (в т.ч. полирезистентные штаммы), а также Actinomycetes и некоторые *патогенные простейшие* (Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis). В основе механизма противомикробного действия сангвиритрина лежит подавление бактериальной нуклеазы, нарушение процессов проницаемости клеточных стенок, перегородок деления, строения нуклеоида.

Показания к применению:

В комплексной терапии острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваний:

— острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции);

— раневые инфекции;

— различные инфекционные осложнения, обусловленные патогенной микрофлорой (реконвалесцентное бактерионосительство);

— заболевания, связанные с нарушением нормальной микрофлоры (дисбактериозы);

— заболевания, вызванные патогенными грибами (фарингомикоз, кандидоз, микроспория).

Относится к болезням:

- Дизентерия
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Сальмонеллез
- Токсикоз
- Фарингит

Противопоказания:

— эпилепсия;

— гиперкинезы;

— бронхиальная астма;

— ИБС;

— тяжелые заболевания печени и почек с нарушением функции;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Таблетки принимают внутрь, не разжевывая, после приема пищи.

Взрослым обычно назначают по 2 таб. 3-4 раза/сут. При необходимости суточная доза может быть повышена до 9 таб.

Детям 10-15 лет назначают 1-2 таб. 3 раза/сут. Максимальная суточная доза - до 6 таб.

Детям 5-10 лет - по 1 таб. 3-4 раза/сут. Максимальная суточная доза - до 4 таб.

Детям 3-5 лет - по 1 таб. 2-3 раза/сут. Максимальные дозы до 3 таб.

Продолжительность курса лечения зависит от нозологической формы и тяжести заболевания и составляет, в среднем:

— при острых кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции) - 5-7 дней (при необходимости до 10 дней);

— при дисбактериозах - до 10-14 дней;

— при бактерионосительстве (бактериовыделении) - 7-14 дней;

— при фарингомикозе и кандидозе - до 14 дней;

— при микроспории - 4-5 недель.

Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции.

При разжевывании таблетки возможны диспептические симптомы (тошнота, рвота), абдоминальные боли.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, абдоминальные боли, головокружение, головная боль.

Лечение: в случае передозировки следует промыть желудок; проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно с учетом ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать, что в 1 таб. препарата содержится 93.7 мг сахара (сахарозы) или сахара-рафинада, что соответствует 0.008 ХЕ.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Не применять по истечении срока годности, указанного не упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sangviritrin_tabletki