

Санорин



Код АТХ:

- [R01AA08](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Нафазолин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Эмульсия для интраназального применения 0,1% во флаконах-капельницах по 10 мл.

Капли 0,05 и 0,1% во флаконах-капельницах темного стекла по 10 мл; в пачке картонной 1 флакон.

Спрей для назального применения 0,1% в пластмассовых флаконах по 10 мл; с механическим распылителем.

Состав:

Эмульсия для интраназального применения 0,1% содержит

Активное вещество: нафазолина нитрат 1 мг на 1 мл

Вспомогательные вещества: эфирное эвкалиптовое масло — 0,25 мг, борная кислота — 0,3 г, вазелиновое масло — 1,15 г, стерильная вода — до 10 мл.

Капли 0,05 и 0,1% содержат

Активное вещество: нафазолина нитрат 0,5 мг или 1 мг на 1 мл

Вспомогательные вещества: борная кислота, эдамин, метилпарабен, стерильная вода.

Спрей для назального применения 0,1% содержит

Активное вещество: нафазолина нитрат 1 мг на 1 мл

Вспомогательные вещества: борная кислота, эдамин, метилпарабен, стерильная вода.

Описание:

Капли назальные: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Спрей: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:**Фармакодинамика**

Фармакологическое действие — сосудосуживающее. Возбуждает альфа₂-адренорецепторы. Вызывает сужение сосудов слизистых и уменьшает отечность, гиперемия, экссудацию слизистой оболочки дыхательных путей, облегчает носовое дыхание.

Фармакокинетика

При местном применении нафазолин полностью всасывается. Терапевтическое действие наступает в течение 5 минут и продолжается 4–6 часов при интраназальном применении. При длительном применении сосудосуживающий эффект постепенно уменьшается, в связи с чем через 5–7 дней лечения следует сделать перерыв на несколько дней.

Показания к применению:

Острый ринит, синусит, ларингит, евстахиит, сенной насморк, воспаление придаточных пазух носа, воспаление среднего уха. Также применяется для снижения отека при диагностических и лекарственных процедурах, гиперемия слизистых оболочек после операций на верхних дыхательных путях, отек голосовых связок и гортани, хроническое воспаление конъюнктивы, снижение остроты зрения, утомление глаз.

Относится к болезням:

- [Воспаление среднего уха](#)
- [Гиперемия слизистых оболочек](#)
- [Евстахиит](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Насморк](#)
- [Отек голосовых связок](#)
- [Отек гортани](#)
- [Ринит](#)
- [Сенной насморк](#)
- [Синусит](#)
- [Утомление глаз](#)

Противопоказания:

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, увеличение щитовидной железы, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, детский возраст до 2 лет (0,1% эмульсия, 0,05 и 0,1% раствор), до 15 лет (0,1% раствор).

Способ применения и дозы:

Санорин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Интраназально: взрослым — по 1–3 капли 0,1% эмульсии или 0,1% раствора в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Детям — по 1–2 капли 0,05% раствора в каждый носовой ход до 3-х раз в сутки с интервалом не менее 4 ч. При носовом кровотечении можно использовать ватные тампоны, смоченные в растворе препарата. Спрей — по 1–3 дозы в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки; непосредственно после ингаляции рекомендуется слегка вдохнуть носом.

Курс лечения — кратковременный, до исчезновения симптомов заложенности носа, но не больше 1 нед у взрослых и 3 дней — у детей. Повторное применение возможно только через несколько дней.

Интраконъюнктивально: использовать только 0,05% раствор, по 1–2 капле в каждый больной глаз 3–4 раза в сутки.

Побочное действие:

Раздражение слизистой оболочки, реактивная гиперемия; при длительном применении — набухание слизистой; тошнота, головная боль, повышение АД, тахикардия (при резорбтивном действии).

Передозировка:

Симптомы: гипотермия, брадикардия, гипергидроз, сонливость, кома.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение Санорина в период беременности возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует назначать вместе с трициклическими антидепрессантами, с ингибиторами моноаминоксидазы или в течение 14 дней после их отмены в связи с угрозой повышения давления крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется использовать при хронических ринитах. С осторожностью назначают при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, феохромоцитоме, гиперфункции щитовидной железы. Частое длительное применение препарата может вызвать хроническую заложенность и сухость слизистой оболочки носа.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре 10–25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sanorin>