

Санорин-Аналергин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли назальные и глазные** в виде прозрачной, бесцветной жидкости.

	1 мл
нафазолина нитрат	250 мкг
антазолина мезилат	5 мг

Вспомогательные вещества: борная кислота, натрия хлорид, метилпарабен, вода стерильная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с резиновой пипеткой "SANO" с крышкой - коробки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии и ЛОР-практике. Оказывает противоаллергическое и сосудосуживающее действие.

Нафазолин - альфа₂-адреномиметик, оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие; уменьшает отечность, гиперемию и экссудативные проявления со стороны слизистых оболочек. Облегчает носовое дыхание при ринитах. Через 5-7 дней применения возникает толерантность.

Антазолин - блокатор гистаминовых H₁-рецепторов, оказывает противоаллергическое, противоотечное действие.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Санорин-Аналергин не предоставлены.

Показания к применению:

- острый ринит (особенно аллергический);
- ринорея;
- аллергический конъюнктивит (в качестве дополнительного средства).

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- выраженный атеросклероз;
- гипотиреоз;
- хронический ринит;
- сахарный диабет;
- тахикардия;
- одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после их отмены;
- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4 раза/сут; по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок 3-4 раза/сут.

Детям назначают по 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза/сут.

Препарат применяют кратковременно, не более 1 недели. Затем необходимо сделать перерыв на несколько дней.

Побочное действие:

Местные реакции: реактивная гиперемия, набухание слизистой оболочки носа; раздражение; при применении более 1 недели - отек слизистой оболочки носа.

Системные реакции: тошнота, тахикардия, головная боль, раздражительность, аллергические реакции, кожная сыпь, повышение АД.

Передозировка:

Симптомы: снижение температуры тела, заторможенность, сонливость, брадикардия, повышение АД.

Лечение: при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по применению препарата при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарат замедляет всасывание местноанестезирующих лекарственных средств.

При одновременном применении ингибиторы МАО повышают риск развития выраженной артериальной гипертензии (за счет высвобождения депонированных катехоламинов под действием нафазолина) и усиливают действие антазолина (за счет замедления его метаболизма в печени).

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат может оказывать резорбтивное действие.

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуют через 5-7 дней применения сделать перерыв на несколько дней.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 2 лет.

Детям назначают по 1-2 капли в каждую ноздрю 3-4 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 10° до 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sanorin-Analergin>