

## [Санорин с маслом эвкалипта](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Нафазолин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капли назальные 0.1%** в виде белой, легко встряхиваемой эмульсии.

	<b>1 мл</b>	<b>1 фл.</b>
нафазолина нитрат	1 мг	10 мг

*Вспомогательные вещества:* этилендиамин, борная кислота, цетиловый спирт, метилпарабен, масло эвкалиптовое, полисорбат 80, холестерин, парафин жидкий, вода очищенная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с капельницей "SANO" и крышкой - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Альфа<sub>2</sub>-адреномиметик. При местном применении оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие на сосуды слизистой оболочки (уменьшает отечность, гиперемию, экссудацию). Облегчает носовое дыхание при ринитах. Через 5-7 дней применения возникает толерантность.

#### **Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике препарата Санорин с маслом эвкалипта не предоставлены.

### **Показания к применению:**

- острый ринит;
- синусит;
- евстахиит;
- ларингит;
- для облегчения проведения риноскопии;

— необходимость остановки носовых кровотечений.

## Относится к болезням:

- [Евстахиит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

- хронический ринит;
- артериальная гипертензия;
- выраженный атеросклероз;
- тахикардия;
- тиреотоксикоз;
- сахарный диабет;
- одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после окончания их применения;
- детский возраст до 15 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** назначают по 1-3 капли в каждый носовой ход 2-3 раза/сут. Применять кратковременно, не более 1 недели. Если носовое дыхание облегчается, то применение препарата Санорин с маслом эвкалипта можно закончить раньше. Повторное применение препарата возможно через несколько дней.

Перед применением флакон необходимо встряхнуть. Открытый флакон с препаратом можно использовать в течение 4 недель.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, повышение АД.

*Со стороны ЦНС:* головная боль, раздражительность.

*Аллергические реакции:* сыпь.

*Местные реакции:* реактивная гиперемия, набухание слизистой оболочки носовой полости; при применении более 1 недели - раздражение, в некоторых случаях - отек слизистой оболочки носа.

## Передозировка:

*Симптомы:* длительное или частое введение препарата Санорин с маслом эвкалипта в носовую полость может вызвать набухание слизистой оболочки носа и ощущение его заложенности. Опасность передозировки (особенно в случае проглатывания) препарата Санорин с маслом эвкалипта возникает у детей младшего возраста и может вызвать угнетение ЦНС, проявлениями которого являются сонливость, понижение температуры тела, повышение потоотделения, замедление ЧСС, повышение АД или его последующее понижение, крайне редко - кома.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Одновременный прием с ингибиторами МАО и период до 14 дней после окончания их применения, повышает риск развития выраженной артериальной гипертензии (высвобождение депонированных катехоламинов под действием нафазолина).

Замедляет всасывание местноанестезирующих средств.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При длительном применении выраженность сосудосуживающего действия постепенно снижается (явление тахифилаксии), в связи с чем рекомендуется через 5-7 дней применения у взрослых сделать перерыв на несколько дней.

Препарат может оказывать резорбтивное действие.

Необходимость применения препарата Санорин с маслом эвкалипта с другими лекарственными средствами врач определяет индивидуально.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст до 15 лет.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 10° до 25°С. Срок годности – 4 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Sanorin\\_s\\_maslom\\_evkalipta](http://drugs.thead.ru/Sanorin_s_maslom_evkalipta)