Саноринчик



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Форма выпуска:

 \Diamond **Капли назальные для детей** в виде прозрачной бесцветной жидкости без запаха, свободной от механических примесей.

1 мл оксиметазолина гидрохлорид 100 мкг		
оксиметазолина гидрохлорид 100 мкг		1 мл
	оксиметазолина гидрохлорид	100 мкг

Вспомогательные вещества: кислота борная, натрия тетраборат, бензалкония хлорид, динатрия эдетат дигидрат, вода очищенная стерильная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с крышкой-пипеткой - пачки картонные.

 \Diamond **Капли назальные для детей** в виде прозрачной бесцветной жидкости без запаха, свободной от механических примесей.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	250 мкг

Вспомогательные вещества: кислота борная, натрия тетраборат, бензалкония хлорид, динатрия эдетат дигидрат, вода очищенная стерильная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с крышкой-пипеткой - пачки картонные.

◊ Капли назальные в виде прозрачной бесцветной жидкости без запаха, свободной от механических примесей.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг
D	6

Вспомогательные вещества: кислота борная, натрия тетраборат, бензалкония хлорид, динатрия эдетат дигидрат, вода очищенная стерильная.

10 мл - флаконы темного стекла (1) с крышкой-пипеткой - пачки картонные.

◊ Спрей назальный в виде прозрачной бесцветной жидкости без запаха, свободной от механических примесей.

	1 мл
оксиметазолина гидрохлорид	500 мкг

10 мл - флаконы пластиковые (1) с механическим распылителем - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик для местного применения. Оказывает сосудосуживающее действие. При интраназальном введении уменьшается отечность слизистой оболочки верхних отделов дыхательных путей. Действие проявляется через 10-15 мин после применения и продолжается в течение 6-8 ч.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Саноринчик отсутствуют.

Показания к применению:

· .	-
—острый инфекционно-восп	12 1111 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

-синусит;

-евстахеит;

-аллергический ринит (в т.ч. сенная лихорадка).

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Инфекции
- Лихорадка
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

- -атрофический (сухой) ринит;
- —беременность (для капель назальных и спрея назального 0.5 мг/мл);
- —лактация (для капель назальных и спрея назального 0.5 мг/мл);
- —детский возраст до 8 лет (для капель назальных и спрея назального 0.5 мг/мл);
- —детский возраст до 1 года и старше 8 лет (для капель назальных 0.25 мг/мл);
- —детский возраст старше 1 года (для капель назальных 0.1 мг/мл);
- -- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Саноринчик в форме назального спрея 0.5 мг/мл и капель назальных 0.5 мг/мл предназначен для **детей старше 8 лет и взрослых**; назначают по 1-2 капли или по 1 дозе спрея в каждую ноздрю 2-3 раза/сут.

Капли назальные 0.25 мг/мл предназначены к применению для **детей в возрасте от 1 года до 8 лет**; назначают по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Капли назальные 0.1 мг/мл предназначены для применения у **детей в возрасте до 1 года**. **Новорожденным (до 4 недель)** назначают по 1 капле в каждую ноздрю 2-3 раза/сут, **детям в возрасте от 5 недель и до 1 года** - по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Продолжительность применения не более 7 дней, при облегчении носового дыхания использование препарата можно прекратить раньше. Повторное назначение возможно только через несколько дней.

Побочное действие:

Местные реакции: преходящая сухость и жжение слизистой оболочки полости носа, сухость в полости рта и глотки, чиханье.

Системные реакции: повышение АД, головная боль, головокружение, сердцебиение, нарушения сна, повышенная тревожность, тошнота, бессонница.

При длительном (более 7 дней) применении препарата: появление реактивной гиперемии слизистой оболочки полости носа, атрофия слизистой оболочки, тахифилаксия.

Передозировка:

Симптомы: при длительном или частом применении препарата возможны тошнота, повышение АД, тахикардия.

Лечение: при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат в форме капель назальных и спрея назального 0.5 мг/мл противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Остальные лекарственные формы предназначены к примененнию у детей младше 8 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При совместном применении с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами возможно повышение АД.

При одновременном применении препарат замедляет всасывание местных анестетиков со слизистой оболочки и удлиняет их действие.

Совместное назначение других сосудосуживающих средств повышает риск развития побочных эффектов.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС), нарушениями углеводного обмена (сахарным диабетом), нарушениями функции щитовидной железы (гипертиреозом) и закрытоугольной глаукомой.

Пациент должен быть предупрежден о том, что без назначения врача препарат в рекомендуемой дозе можно применять в течение не более 3 дней.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, занимающимся видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций, следует учитывать, что препарат может влиять на зрение и снижать скорость психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Капли назальные 0.25 мг/мл предназначены к применению для **детей в возрасте от 1 года до 8 лет**; назначают по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Капли назальные 0.1 мг/мл предназначены для применения у **детей в возрасте до 1 года**. **Новорожденным (до 4 недель)** назначают по 1 капле в каждую ноздрю 2-3 раза/сут, **детям в возрасте от 5 недель и до 1 года** - по 1-2 капли 2-3 раза/сут.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 10° до 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

2 года.

Саноринчик

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Источник: http://drugs.thead.ru/Sanorinchik