

## Санпраз



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пантопразол

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	<b>1 таб.</b>
пантопразола натрия сесквигидрат	45.1 мг,
что соответствует содержанию пантопразола	40 мг

**Вспомогательные вещества:** магния оксид - 18 мг, кальция карбонат - 81.4 мг, кросповидон - 35 мг, натрия лаурилсульфат - 5 мг, кальция стеарат - 3 мг, кремния диоксид коллоидный - 5 мг.

**Состав оболочки:** сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1) - 11 мг, триэтилцитрат - 1.1 мг, коповидон - 7 мг, тальк - 10.7 мг, титана диоксид (E171) - 0.8 мг, железа оксид желтый (E172) - 0.2 мг, макрогол 6000 - 0.35 мг.

10 шт. - стрипы алюминиевые (1) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.

10 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ингибитор  $H^+K^+-ATP$ -азы. Блокирует заключительную стадию секреции хлороводородной (соляной) кислоты, снижает уровень базальной и стимулированной (независимо от вида раздражителя) секреции хлороводородной (соляной) кислоты в желудке. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с *Helicobacter pylori*, снижение желудочной секреции повышает чувствительность микроорганизма к антибиотикам.

Не влияет на моторику ЖКТ. Секреторная активность нормализуется через 3-4 дня после окончания приема препарата.

#### Фармакокинетика

##### Всасывание

После приема препарата внутрь пантопразол быстро абсорбируется из ЖКТ.  $C_{max}$  достигается через 2.5 ч и составляет 2-3 мг/л, при этом значение  $C_{max}$  остается неизменным при многократном приеме. Биодоступность 65-77%.

##### Выведение

$T_{1/2}$  - около 1 ч.

## Показания к применению:

- язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- эрозивный гастрит (в т.ч. ассоциированный с *Helicobacter pylori*);
- эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВП;
- рефлюкс-эзофагит.

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

## Противопоказания:

- диспепсия невротического генеза;
- злокачественные заболевания ЖКТ;
- детский возраст (из-за отсутствия данных о применении препарата в педиатрической практике);
- повышенная чувствительность к пантопрозолу.

С *осторожностью* назначают препарат при печеночной недостаточности.

## Способ применения и дозы:

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивном гастрите* препарат назначают по 40-80 мг/сут. Курс лечения при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки составляет 2 недели, а язвенной болезни желудка - 4-8 недель.

Для профилактики обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки назначают по 20 мг/сут.

Для эрадикации *Helicobacter pylori* принимают по 40 мг 2 раза/сут в комбинации с противомикробными средствами. Курс терапии - 7-14 дней.

При *эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП*, назначают по 40-80 мг/сут. Курс лечения - 4-8 недель. Для профилактики эрозивных поражений на фоне длительного применения НПВП - по 20 мг/сут.

При *рефлюкс-эзофагите* назначают по 20-40 мг/сут. Курс терапии составляет 4-8 недель. Для профилактики обострений принимают по 20 мг/сут.

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** дозу следует снизить до 40 мг 1 раз в 2 дня, при этом необходимо контролировать биохимические показатели крови. При повышении активности печеночных ферментов препарат следует отменить.

Таблетки принимают внутрь целиком (не размельчая и не растворяя), запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуют принимать за 1 ч до завтрака, при кратности приема 2 раза/сут вторую дозу - за 1 ч до ужина.

## Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль; очень редко - депрессия, слабость, головокружение, нарушение зрения.

Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, боли в верхней части живота, запор, метеоризм; в единичных случаях (1 случай на 10<sup>6</sup> пациентов) - тяжелое гепатоцеллюлярное поражение печени с желтухой,

нарушения функции печени.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи, анафилактические реакции (вплоть до шока).

*Прочие:* болезненное напряжение молочных желез, гипертермия.

## **Передозировка:**

Данные по передозировке препарата Санпраз не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

С осторожностью назначают препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении пантопразол может уменьшить всасывание лекарственных средств, биодоступность которых зависит от pH среды желудка (например, кетоконазол).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

До начала и после окончания терапии обязателен эндоскопический контроль (при необходимости - с биопсией) для исключения злокачественного новообразования желудка или пищевода, т.к. применение препарата может отсрочить постановку правильного диагноза.

### ***При нарушениях функции печени***

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** дозу следует снизить до 40 мг 1 раз в 2 дня, при этом необходимо контролировать биохимические показатели крови. При повышении активности печеночных ферментов препарат следует отменить.

### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст (из-за отсутствия данных о применении препарата в педиатрической практике).

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sanpraz>