Санпраз



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пантопразол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой желтого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
пантопразола натрия сесквигидрат	45.1 мг,
что соответствует содержанию пантопразола	40 мг

Вспомогательные вещества: магния оксид - 18 мг, кальция карбонат - 81.4 мг, кросповидон - 35 мг, натрия лаурилсульфат - 5 мг, кальция стеарат - 3 мг, кремния диоксид коллоидный - 5 мг.

Состав оболочки: сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1) - 11 мг, триэтилцитрат - 1.1 мг, коповидон - 7 мг, тальк - 10.7 мг, титана диоксид (E171) - 0.8 мг, железа оксид желтый (E172) - 0.2 мг, макрогол 6000 - 0.35 мг.

10 шт. - стрипы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
10 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ингибитор H^+-K^+-АТФ-азы. Блокирует заключительную стадию секреции хлороводородной (соляной) кислоты, снижает уровень базальной и стимулированной (независимо от вида раздражителя) секреции хлороводородной (соляной) кислоты в желудке. При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori, снижение желудочной секреции повышает чувствительность микроогранизма к антибиотикам.

Не влияет на моторику ЖКТ. Секреторная активность нормализуется через 3-4 дня после окончания приема препарата.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема препарата внутрь пантопразол быстро абсорбируется из ЖКТ. C_{max} достигается через 2.5 ч и составляет 2-3 мг/л, при этом значение C_{max} остается неизменным при многократном приеме. Биодоступность 65-77%.

Выведение

$T_{1/2}$ - около 1 ч.

Показания к применению:

— язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— эрозивный гастрит (в т.ч. ассоциированный с Helicobacter pylori);

— эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВП;

— рефлюкс-эзофагит.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Рефлюкс-эзофагит
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— диспепсия невротического генеза;

— злокачественные заболевания ЖКТ;

— детский возраст (из-за отсутствия данных о применении препарата в педиатрической практике);

— повышенная чувствительность к пантопразолу.

С *осторожностью* назначают препарат при печеночной недостаточности.

Способ применения и дозы:

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивном гастрите* препарат назначают по 40-80 мг/сут. Курс лечения при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки составляет 2 недели, а язвенной болезни желудка - 4-8 недель.

Для *профилактики обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки* назначают по 20 мг/сут.

Для *эрадикации Helicobacter pylori* принимают по 40 мг 2 раза/сут в комбинации с противомикробными средствами. Курс терапии - 7-14 дней.

При *эрозивно-язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, связанных с приемом НПВП,* назначают по 40-80 мг/сут. Курс лечения - 4-8 недель. Для *профилактики эрозивных поражений на фоне длительного применения НПВП* - по 20 мг/сут.

При *рефлюкс-эзофагите* назначают по 20-40 мг/сут. Курс терапии составляет 4-8 недель. Для *профилактики обострений* принимают по 20 мг/сут.

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** дозу следует снизить до 40 мг 1 раз в 2 дня, при этом необходимо контролировать биохимические показатели крови. При повышении активности печеночных ферментов препарат следует отменить.

Таблетки принимают внутрь целиком (не размельчая и не растворяя), запивая достаточным количеством жидкости. Препарат рекомендуют принимать за 1 ч до завтрака, при кратности приема 2 раза/сут вторую дозу - за 1 ч до ужина.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль; очень редко - депрессия, слабость, головокружение, нарушение зрения.

Со стороны пищеварительной системы: диарея, тошнота, боли в верхней части живота, запор, метеоризм; в единичных случаях (1 случай на 10^6 пациентов) - тяжелое гепатоцеллюлярное поражение печени с желтухой,

нарушения функции печени.

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи, анафилактические реакции (вплоть до шока).

Прочие: болезненное напряжение молочных желез, гипертермия.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата Санпраз не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью назначают препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении пантопразол может уменьшить всасывание лекарственных средств, биодоступность которых зависит от pH среды желудка (например, кетоконазол).

Особые указания и меры предосторожности:

До начала и после окончания терапии обязателен эндоскопический контроль (при необходимости - с биопсией) для исключения злокачественного новообразования желудка или пищевода, т.к. применение препарата может отсрочить постановку правильного диагноза.

При нарушениях функции печени

У **пациентов с выраженными нарушениями функции печени** дозу следует снизить до 40 мг 1 раз в 2 дня, при этом необходимо контролировать биохимические показатели крови. При повышении активности печеночных ферментов препарат следует отменить.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст (из-за отсутствия данных о применении препарата в педиатрической практике).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sanpraz