

[Саридон](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
парацетамол	250 мг
пропифеназон	150 мг
кофеин	50 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, казеина формальдегид, метилгидроксипропилцеллюлоза, кремний безводный мелкодисперсный.

10 шт. - блистеры.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Саридон - комбинированное лекарственное средство, содержащее парацетамол, кофеин и пропифеназон. Парацетамол и пропифеназон оказывают болеутоляющее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Кофеин уменьшает сонливость и чувство усталости, оказывает действие на сердечно-сосудистую систему: увеличивает ЧСС, повышает АД при гипотонии и в данной комбинации усиливает болеутоляющее действие остальных компонентов.

Показания к применению:

Боль различной этиологии, в т.ч.:

- головная боль;
- зубная боль;
- мигренозная боль;
- невралгия;
- миалгия;
- ишиас;
- посттравматическая и послеоперационная боль;

— дисменорейные боли.

Для снижения повышенной температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Относится к болезням:

- [Дисменорея](#)
- [Зубная боль](#)
- [Инфекции](#)
- [Ишиас](#)
- [Миалгия](#)
- [Мигрень](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- выраженные нарушения функции печени или почек;
- генетический дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- глаукома;
- анемия;
- лейкопения;
- повышенная возбудимость;
- бессонница;
- ИБС, стенокардия;
- дети до 12 лет.

Нежелательно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Не следует сочетать с приемом алкогольных напитков.

Способ применения и дозы:

Применяют внутрь, **взрослым** обычно по 1 таб. 3-4 раза/сут. Максимальная разовая доза для взрослых 2 таб., суточная - 6 таб.

Продолжительность приема не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней в качестве обезболивающего средства.

Для **подростков 12-18 лет** -1/2 -1 таб. 2-3 раза/сут.

Таблетки рекомендуется принимать после еды, запивая большим количеством жидкости.

Побочное действие:

В терапевтических дозах препарат обычно хорошо переносится.

Иногда возможны кожные аллергические реакции, тошнота, рвота, сердцебиение, головокружение, нарушение сна.

Редко - нарушения системы крови (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз).

При *длительном приеме в высоких дозах* возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие

Передозировка:

Признаки острого отравления: тошнота, рвота, боли в желудке, потливость, бледность кожных покровов, тахикардия. Пострадавшему следует сделать промывание желудка, назначить адсорбенты (активированный уголь) и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нежелательно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать одновременного применения препарата Саридон с барбитуратами, противосудорожными средствами, рифампицином, карбамазепином и алкогольными напитками.

Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола.

Кофеин ускоряет всасывание эрготамина.

Пропифеназон усиливает действие пероральных антидиабетических средств и антикоагулянтов, снижает эффективность калийсберегающих диуретиков.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказания: выраженные нарушения функции почек.

При нарушениях функции печени

Противопоказания: выраженные нарушения функции печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: дети до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре ниже 30°C, в недоступном для детей месте

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Saridon>