

## Себидин



### **Код АТХ:**

- [A01AB03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Хлоргексидин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противомикробное средство широкого спектра действия.

Хлоргексидин, разрушая клеточные мембраны бактерий, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (неактивен в отношении кислотоустойчивых палочек *Pseudomonas*, спор и вирусов). Эффективно удаляет зубные отложения.

Наличие аскорбиновой кислоты (витамина С) повышает местный иммунитет тканей к действию таких факторов, как зубной камень, предохраняет от пародонтопатии; участвует в процессе образования коллагена и межклеточного вещества.

### **Показания к применению:**

- инфекции полости рта, горла, гортани;
- воспалительные заболевания десен;
- пародонтит после хирургического вмешательства;
- пародонтопатия;
- пародонтоз;

— афтозный стоматит.

**Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)

**Противопоказания:**

— гиперчувствительность.

*С осторожностью:* детский возраст.

**Способ применения и дозы:**

Медленно рассасывают по 1 таб. 4-5 раз/сут. Курс лечения - 7 дней. При необходимости назначают 3 таб./сут, в течение 21 дня.

**Побочное действие:**

Тошнота, боли в эпигастрии, аллергические реакции (кожная сыпь), нарушение вкуса, паротит, болезненность языка и слизистых оболочек; изменение цвета пломб и зубных протезов.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Органические вещества (плазма, фосфолипиды) снижают эффективность.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Пациентам, страдающим кариесом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахарозу.

***Применение в детском возрасте***

*С осторожностью:* детский возраст.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sebidin>