Себидин



Код АТХ:

- A01AB03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство широкого спектра действия.

Хлоргексидин, разрушая клеточные мембраны бактерий, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (неактивен в отношении кислотоустойчивых палочек Pseudomonas, спор и вирусов). Эффективно удаляет зубные отложения.

Наличие аскорбиновой кислоты (витамина С) повышает местный иммунитет тканей к действию таких факторов, как зубной камень, предохраняет от пародонтопатии; участвует в процессе образования коллагена и межклеточного вещества.

Показания к применению:

— инфекции полости рта, горла, гортани;

— воспалительные заболевания десен;

— пародонтит после хирургического вмешательства;

— пародонтопатия;

— пародонтоз;

— афтозный стоматит.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Пародонтит
- Стоматит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью:* детский возраст.

Способ применения и дозы:

Медленно рассасывают по 1 таб. 4-5 раз/сут. Курс лечения - 7 дней. При необходимости назначают 3 таб./сут, в течение 21 дня.

Побочное действие:

Тошнота, боли в эпигастрии, аллергические реакции (кожная сыпь), нарушение вкуса, паротит, болезненность языка и слизистых оболочек; изменение цвета пломб и зубных протезов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Органические вещества (плазма, фосфолипиды) снижают эффективность.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам, страдающим кариесом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахарозу.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью:* детский возраст.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sebidin