

Себидин



Код АТХ:

- [A01AB03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство широкого спектра действия.

Хлоргексидин, разрушая клеточные мембраны бактерий, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (неактивен в отношении кислотоустойчивых палочек *Pseudomonas*, спор и вирусов). Эффективно удаляет зубные отложения.

Наличие аскорбиновой кислоты (витамина С) повышает местный иммунитет тканей к действию таких факторов, как зубной камень, предохраняет от пародонтопатии; участвует в процессе образования коллагена и межклеточного вещества.

Показания к применению:

- инфекции полости рта, горла, гортани;
- воспалительные заболевания десен;
- пародонтит после хирургического вмешательства;
- пародонтопатия;
- пародонтоз;

Себидин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— афтозный стоматит.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Пародонтит](#)
- [Стоматит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С осторожностью: детский возраст.

Способ применения и дозы:

Медленно рассасывают по 1 таб. 4-5 раз/сут. Курс лечения - 7 дней. При необходимости назначают 3 таб./сут, в течение 21 дня.

Побочное действие:

Тошнота, боли в эпигастрии, аллергические реакции (кожная сыпь), нарушение вкуса, паротит, болезненность языка и слизистых оболочек; изменение цвета пломб и зубных протезов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Органические вещества (плазма, фосфолипиды) снижают эффективность.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентам, страдающим кариесом, необходимо учитывать, что таблетки содержат сахарозу.

Применение в детском возрасте

С осторожностью: детский возраст.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Sebidin>