Седативный Сбор №2



Код АТХ:

- N05CX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Валерианы лекарственной корневища с корнями
- Мяты перечной листья
- Пустырника трава
- Солодки корни
- Хмеля соплодия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Седативное средство растительного происхождения.

Настой сбора обладает успокаивающим и умеренным спазмолитическим эффектом.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— повышенная возбудимость;

— нарушения сна;

— артериальная гипертензия (начальная стадия).

Относится к болезням:

- Гипертензия

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Измельченное сырье: 10 г (3 ст.ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

Сбор-порошок: 1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение 30 мин. Затем фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

Повторение курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендованные - мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sedativnyy_Sbor_no2