

## [Седативный Сбор №2](#)



### **Код АТХ:**

- [N05CX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Валерианы лекарственной корневища с корнями](#)
- [Мяты перечной листья](#)
- [Пустырника трава](#)
- [Солодки корни](#)
- [Хмеля соплодия](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)<sup>мнн</sup> [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Нейротропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Седативное средство растительного происхождения.

Настой сбора обладает успокаивающим и умеренным спазмолитическим эффектом.

### **Показания к применению:**

В составе комплексной терапии:

- повышенная возбудимость;
- нарушения сна;
- артериальная гипертензия (начальная стадия).

### **Относится к болезням:**

- [Гипертензия](#)

### Противопоказания:

— гиперчувствительность.

### Способ применения и дозы:

**Измельченное сырье:** 10 г (3 ст.ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/3 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

**Сбор-порошок:** 1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают в течение 30 мин. Затем фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь в теплом виде по 1/2 стакана 2 раза/сут за 20-30 мин до еды в течение 2-4 нед.

Повторение курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

### Побочное действие:

Аллергические реакции.

### Передозировка:

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендованные - мышечная слабость, сонливость, снижение работоспособности.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

### Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Sedativnyy\\_sbor\\_no2](http://drugs.thead.ru/Sedativnyy_sbor_no2)