

## Секнидокс



### **Код АТХ:**

- [P01AB07](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Секнидазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** голубого цвета, капсуловидной формы, с гравировкой "SECN" на одной стороне и поперечной риской на другой стороне.

	<b>1 таб.</b>
секнидазол	1 г

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 103.73 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 62.25 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 37.35 мг, кальция гидрофосфат - 32.25 мг, повидон К30 - 17.4 мг, магния стеарат - 7.4 мг, тальк - 4.5 мг.

*Состав пленочной оболочки:* гипромеллоза Е-15 - 32.3 мг, титана диоксид (Е171) - 5.2 мг, тальк - 5.2 мг, лак алюминиевый на основе индигокармина (Е132) - 4.2 мг, пропиленгликоль - 4.5 мг.

2 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Производное нитроимидазола. Оказывает бактерицидное (против грамположительных и грамотрицательных анаэробных бактерий) и амебицидное (внутри- и внекишечное) действие. Секнидазол особенно *активен в отношении* *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica* и *Giardia lamblia*.

Проникая внутрь клетки микроорганизма, секнидазол активируется в результате восстановления 5-нитрогруппы, за счет чего взаимодействует с клеточной ДНК. Происходит нарушение ее спиралевидной структуры и разрушение нитей, ингибирование нуклеотидного синтеза и гибель клетки.

### Фармакокинетика

#### Всасывание и распределение

После приема внутрь секнидазол быстро всасывается из ЖКТ. Биодоступность составляет около 80%. После приема 2 г секнидазола  $C_{max}$  в плазме достигается через 3-4 ч.

Секнидазол проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, экскретируется с грудным молоком.

#### Выведение

$T_{1/2}$  секнидазола из плазмы крови составляет около 25 ч. Препарат медленно выводится из организма, в основном с мочой: около 50% принятой дозы экскретируется за 120 ч.

## Показания к применению:

- уретрит и вагинит, вызванные *Trichomonas vaginalis*;
- амебиаз кишечника, вызванный *Entamoeba histolytica*;
- амебиаз печени, вызванный *Entamoeba histolytica*;
- жиардиаз, вызванный *Giardia lamblia*.

## Относится к болезням:

- [Амебиаз](#)
- [Вагинит](#)
- [Уретрит](#)

## Противопоказания:

- органические заболевания ЦНС;
- заболевания крови (в т.ч. в анамнезе);
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 3 лет или масса тела менее 16 кг (для данной лекарственной формы);
- гиперчувствительность к секнидазолу, другим производным имидазола или любому другому компоненту препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, непосредственно перед едой, запивая небольшим количеством воды.

#### Уретрит и вагинит

**Взрослым** - однократный прием 2 г секнидазола (2 таб.), курс лечения 1 день.

Следует проводить одновременное лечение обоих половых партнеров.

#### Амебиаз кишечника

**Острый амебиаз с выраженной симптоматикой (форма histolytica):** **взрослым** - однократный прием 2 г секнидазола (2 таб.), курс лечения 1 день; **детям** - однократный прием дозы 30 мг/кг, курс лечения 1 день.

**Амебиаз без клинической симптоматики, включая очаговую и цистную формы (minuta и cystic):** **взрослым** - 2 г секнидазола (2 таб.) в один или несколько приемов в течение 3 дней; **детям** - 30 мг/кг/сут в один или несколько приемов в течение 3 дней.

#### Амебиаз печени

**Взрослым** - 1.5 г секнидазола (1.5 таб.) в один или несколько приемов в течение 5 дней; **детям** - 30 мг/кг/сут в один или несколько приемов в течение 5 дней.

#### Жиардиаз

**Детям** - однократный прием дозы 30 мг/кг, курс лечения 1 день.

## Побочное действие:

**Аллергические реакции:** крапивница, сыпь, ангионевротический отек; очень редко - анафилактическая реакция.

**Со стороны крови и лимфатической системы:** умеренная обратимая лейкопения.

**Со стороны нервной системы:** головокружение, нарушение координации движений (атаксия), снижение кожной чувствительности (парестезия), периферическая невропатия.

**Со стороны пищеварительной системы:** тошнота, рвота, боли в области желудка, "металлический" привкус во рту, глоссит, стоматит.

**Прочие:** лихорадка.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, пациенту следует сообщить об этом врачу.

## Передозировка:

**Симптомы:** усиление дозозависимых побочных эффектов.

**Лечение:** симптоматическое. Прием препарата следует прекратить, необходимо очистить желудок, принять активированный уголь; пациенту следует немедленно обратиться к врачу.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Накопленный к настоящему времени опыт недостаточен для оценки возможного фетотоксического действия секнидазола. У животных секнидазол не вызывал тератогенных эффектов. Тем не менее, поскольку секнидазол способен проникать через плацентарный барьер, а результаты, получаемые на животных, не всегда могут быть распространены на людей, не рекомендуется назначать секнидазол во время беременности.

Секнидазол выводится с грудным молоком. На время лечения следует отказаться от грудного вскармливания. Были зарегистрированы случаи кандидоза слизистой оболочки полости рта и анальной области, а также случаи диареи у младенцев, которые были на грудном вскармливании у матерей, получавших производные имидазола (но не секнидазол).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

**Дисульфирам:** при совместном применении секнидазола с дисульфирамом возможны психотические реакции, состояние спутанности сознания.

**Антикоагулянты для приема внутрь (например, варфарин):** секнидазол усиливает действие непрямых антикоагулянтов (производных кумарина или индандиона) и повышает риск возникновения кровотечений за счет снижения печеночного метаболизма антикоагулянтов.

**Этанол:** сочетание с этанолом вызывает симптомы "антабусной реакции" (спазмы в животе, тошнота, рвота, головная

боль, "приливы жара", тахикардия).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При печеночном амебиазе в фазе нагноения прием препарата следует сочетать с дренажным удалением гноя или с удалением абсцессов.

При одновременном приеме непрямых антикоагулянтов необходимо чаще определять протромбиновое время и осуществлять мониторинг МНО и при необходимости корректировать дозу антикоагулянта на протяжении всего курса терапии секнидазолом и в течение 8 дней после окончания терапии.

На время терапии секнидазолом и в течение 5 дней после ее завершения необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков и лекарственных препаратов, содержащих этанол.

При лечении трихомонадного вагинита у женщин и трихомонадного уретрита у мужчин пациенты должны воздерживаться от половой жизни. Обязательно одновременное лечение половых партнеров. Лечение не прекращается во время менструации.

Следует избегать применения препарата у пациентов с заболеванием крови в анамнезе. Длительное применение желательно проводить под контролем формулы крови. При лейкопении возможность продолжения лечения зависит от риска развития инфекционного процесса.

Появление атаксии, головокружения и любое другое ухудшение неврологического статуса больных требует прекращения лечения.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Возможны такие побочные эффекты, как головокружение и нарушение координации движений. При появлении этих побочных действий пациентам рекомендуется воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты реакции.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Seknidoks>