

## Секстафаг



### **Код АТХ:**

- [V03A](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Пиобактериофаг](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Форма выпуска:**

Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения во флаконах по 20 мл; в пачке картонной 4 или 10 флаконов.

### **Состав:**

**1 мл раствора для приема внутрь содержит**

*Активное вещество:* смесь фаголизата стафилококков, стрептококков, эшерихий коли, протей, псевдомонас аэругиноза и клебсиелл пневмонии.

### **Описание:**

Раствор для приема внутрь — прозрачная жидкость с желтоватым или зеленоватым оттенком.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Иммунотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

### Фармакодинамика

Фармакологическое действие- антибактериальное. Бактериофаг представляет собой вирус бактерий, который проникает в бактериальную клетку, размножается в ней, разрушая ее, выходит в виде зрелых частиц, готовых к заражению новых бактериальных клеток. Пиобактериофаг поливалентный (Секстафаг) обладает способностью специфически лизировать микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, патогенные кишечные и синегнойные бактерии), *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*.

Препарат предназначен для терапии и профилактики различных видов гнойно-воспалительных, а также энтеральных заболеваний, которые вызваны чувствительными возбудителями (в том числе, гнойно-воспалительных заболеваний горла, носа, уха, дыхательных путей, легких либо плевры; хирургических, урогенитальных, а также энтеральных инфекций; септических генерализированных заболеваний, в том числе и гнойно-септических заболеваний детей грудного возраста и новорожденных).

### Фармаконетика

Независимо от способа введения, препараты бактериофагов проникают в кровь и лимфу и попадают в очаг воспаления. Основная часть препарата выводится почками, оказывая санирующий эффект на мочевыводящие пути, а остальная часть - через желудочно-кишечный тракт.

## Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- гнойно-воспалительные заболевания уха, горла, носа, дыхательных путей, легких и плевры (воспаления пазух носа, среднего уха, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, плеврит);
- хирургические инфекции (гнойные поражения кожи, нагноение ран, абсцесс, флегмона, мастит, остеомиелит, перитонит, ожоги);
- урогенитальная инфекция (уретрит, цистит, пиелонефрит, кольпит, эндометрит, сальпингоофорит);
- энтеральные инфекции (гастроэнтероколит, холецистит, дисбактериоз кишечника);
- генерализованные септические состояния;
- гнойно-септические заболевания у новорожденных и детей грудного возраста (омфалит, пемфигус, гастроэнтероколит, сепсис).
- обработка свежеинфицированных ран;
- профилактика внутрибольничных инфекций по эпидемиологическим показаниям.

## Относится к болезням:

- [Абсцесс](#)
- [Ангина](#)
- [Бронхит](#)
- [Воспаление пазух носа](#)
- [Воспаление среднего уха](#)
- [Гастроэнтероколит](#)
- [Дисбактериоз кишечника](#)
- [Кольпит](#)
- [Ларингит](#)
- [Мастит](#)
- [Ожоги](#)
- [Омфалит](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Пемфигус](#)
- [Перитонит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пневмония](#)
- [Раны](#)
- [Сальпингоофорит](#)
- [Сепсис](#)
- [Трахеит](#)
- [Уретрит](#)
- [Фарингит](#)

- [Флегмона](#)
- [Холецистит](#)
- [Цистит](#)
- [Эндометриит](#)

## Противопоказания:

Противопоказанием к использованию препарата Секстафаг является индивидуальная непереносимость препарата.

## Способ применения и дозы:

Секстафаг (пиобактериофаг поливалентный) применяется в зависимости от характера очага инфекции: местно в виде полосканий, орошений, примочек; внутриполостно для введения в полости ран, абсцессов, брюшную, плевральные, для обкалывания флегмон, введения в полость носа, носовых пазух, полость среднего уха, мочевого пузыря, матки, влагалища. Кроме того, препарат принимают внутрь, вводят через зонд, а также в виде высоких клизм.

Длительность курса лечения Пиобактериофагом поливалентным — от 5 до 15 дней; применяют 1–3 раза в день.

Доза определяется индивидуально. Возможно проведение повторных курсов лечения.

При пиелонефрите, энтероколите, холецистите, дисбактериозе кишечника, любых гнойно-септических заболеваниях различной локализации — рег ос, в жидкой форме по 5–20 мл 3 раза в день в течение 10–15 дней.

При неукротимой рвоте и у детей первого года жизни возможно дополнительное введение Пиобактериофага поливалентного через зонд, в виде высоких клизм в дозе 3–5 мл ежедневно в течение 5–7 дней.

Местно Пиобактериофаг поливалентный применяют в виде орошения, примочек и тампонирования в количестве до 200 мл с учетом размеров пораженного участка.

Внутриполостно — по 5–30 мл.

При абсцессах количество вводимого Пиобактериофага поливалентного должно быть несколько меньше объема удаленного гноя; назначают 1–3 раза в день, курс — 5–15 дней.

В проктологии для предоперационной подготовки Пиобактериофаг поливалентный применяют в виде капельных клизм (100–200 мл по 60 капель в минуту).

При инфекциях лор-органов: внутриполостно — по 2–20 мл 1–3 раза в день.

При лечении омфалитов, пиодермий новорожденных: в виде аппликаций, примочек ежедневно 2 раза в день в течение 5–7 дней.

При приеме внутрь жидкой формы детям старше 3 лет и взрослым следует принять внутрь раствор питьевой соды (0,5 ч.ложки на 0,5 стакана воды).

При местном применении Пиобактериофага поливалентного, если для обработки ран применялись химические антисептики (за исключением фурацилина), рану следует промыть стерильным физиологическим раствором хлорида натрия или 2–3% раствором соды.

## Побочное действие:

Побочных действий на применение препарата Секстафаг не отмечено.

## Передозировка:

О случаях передозировки препарата Актовегин не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

До сих пор в клинической практике не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении препарата у беременных. В экспериментальных исследованиях не было выявлено тератогенного воздействия на плод.

Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т.к. отсутствуют данные о проникновении

препарата в грудное молоко.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Использование препарата секстафаг возможно в комбинации с иными лекарственными средствами, в частности и с антибиотиками.

Использование бактериофага не исключает возможности применения антибактериальных либо противовоспалительных препаратов.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Немаловажным условием результативной фаготерапии выступает первоначальное определение фагочувствительности возбудителя. Вскрытие ампул либо флаконов, а также процедуру введения секстафага (пиобактериофага поливалентного) производят при тщательном соблюдении правил антисептики.

Прежде чем применять препарат, флаконы и ампулы необходимо встряхнуть и просмотреть: раствор препарата должен быть прозрачным, без осадка. При помутнении лекарственного средства секстафаг либо при нарушении целостности упаковки препарат нельзя использовать.

Хранение препарата секстафаг после вскрытия ампулы либо флакона не допускается.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8°C.

### **Срок годности:**

2 года. 6 мес — после переконтроля

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Sekstafag>