# Сеннагуд



### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

## Форма выпуска:

#### Форма выпуска, описание и состав

 $\Diamond$  **Таблетки** от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые, с вкраплениями.

	1 таб.
экстракт сенны	22.5 мг,
в т.ч. кальциевые соли сеннозидов А и В	13.5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 91 мг, кроскармеллоза натрия - 7.2 мг, крахмал кукурузный - 6 мг, тальк - 6 мг, кремния диоксид коллоидный - 5 мг, магния стеарат - 2 мг, целлюлоза микрокристаллическая - до получения таблетки массой 200 мг.

- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (1) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (2) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (4) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (6) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (10) пачки картонные.
- 10 шт. упаковки ячейковые контурные (50) пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Слабительное средство растительного происхождения. В листьях сенны содержатся диантроновые гликозиды (около 3%) - сеннозиды A, A<sub>1</sub>, B-G; небольшое количество антрахиноновых гликозидов, в т.ч. алоэ-эмодина и реин 8-гликозидов; около 10% слизи; флавоноиды, в т.ч. производные камферола; гликозиды нафталена.

Стимулирует перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 8-10 ч после приема. Избирательно действует на ободочную кишку, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, не вызывает привыкания и не влияет на пищеварение.

## Показания к применению:

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах; спастические и атонические запоры различной этиологии.

#### Относится к болезням:

- Анальные трещины
- Геморрой
- Гипотония
- Запор
- Проктит

### Противопоказания:

Кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, нарушения водного и электролитного обмена, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор.

# Способ применения и дозы:

Принимают внутрь вечером после еды. Доза зависит от применяемой лекарственной формы.

## Побочное действие:

Возможно: метеоризм, коликообразные боли в животе.

При *длительном применении, особенно в высоких дозах,* - потеря электролитов (в основном калия), альбуминурия и гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, повреждение межмышечного сплетения.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют при беременности и в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют при заболеваниях печени и/или почек. Можно использовать для предоперационной подготовки пациентов.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sennagud