

[Сенны Экстракт Сухой Таблетки 300 Мг](#)



Код АТХ:

- [A06AB06](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство растительного происхождения. В листьях сенны содержатся диантроновые гликозиды (около 3%) - сеннозиды А, А₁, В-С; небольшое количество антрахиноновых гликозидов, в т.ч. алоэ-эмодина и реин 8-гликозидов; около 10% слизи; флавоноиды, в т.ч. производные камферола; гликозиды нафталена.

Стимулирует перистальтику толстой кишки, вызывает нормальный стул через 8-10 ч после приема. Избирательно действует на ободочную кишку, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, не вызывает привыкания и не влияет на пищеварение.

Показания к применению:

Запоры, обусловленные гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах; спастические и атонические запоры различной этиологии.

Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Геморрой](#)
- [Гипотония](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

Противопоказания:

Кишечная непроходимость, боли в животе неясного генеза, нарушения водного и электролитного обмена, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из

ЖКТ, маточные кровотечения, цистит, спастический запор.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь вечером после еды. Доза зависит от применяемой лекарственной формы.

Побочное действие:

Возможно: метеоризм, коликообразные боли в животе.

При *длительном применении, особенно в высоких дозах*, - потеря электролитов (в основном калия), альбуминурия и гематурия, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, повреждение межмышечного сплетения.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью применяют при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют при заболеваниях печени и/или почек. Можно использовать для предоперационной подготовки пациентов.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют при заболеваниях почек.

При нарушениях функции печени

С осторожностью применяют при заболеваниях печени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Senny_Ekstrakt_Suhoy_Tabletki_300_Mg