

## СептаНазал



### Код АТХ:

- [R01AB06](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ксилометазолин](#)
- [Декспантенол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Спрей назальный дозированный, 0,1 мг + 5 мг/доза. 90 доз препарата (10 мл) во флаконе из ПЭВП с дозирующим устройством (помпой) и прозрачным защитным колпачком из комбинированного материала. 1 фл. помещают в пачку картонную.

Спрей назальный дозированный (для детей), 0,05 мг + 5 мг/доза. 90 доз препарата (10 мл) во флаконе из ПЭВП с дозирующим устройством (помпой) и цветным защитным колпачком из комбинированного материала. 1 фл. помещают в пачку картонную.

### Состав:

Спрей для назального применения дозированный	1 мл/1 доза
<i>активные вещества:</i>	
ксилометазолина гидрохлорид	1/0,1 мг
декспантенол	50/5 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> калия дигидрофосфат — 9/0,9 мг; натрия гидрофосфата додекагидрат — 0,3/0,03 мг; вода очищенная — до 1/0,1 мл	
1 доза препарата — около 0,1 мл раствора	
номинальное количество доз препарата во флаконе — 90 доз	
Спрей для назального применения дозированный для	1 мл/1 доза

детей	
<i>активные вещества:</i>	
ксилометазолина гидрохлорид	0,5/0,05 мг
декспантенол	50/5 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> калия дигидрофосфат — 9/0,9 мг; натрия гидрофосфата додекагидрат — 0,3/0,03 мг; вода очищенная — до 1/0,1 мл	
1 доза препарата — около 0,1 мл раствора	
номинальное количество доз препарата во флаконе — 90 доз	

## Описание:

Прозрачный, бесцветный раствор.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антиконгестивное, регенерирующее, альфа-адреномиметическое.

### Фармакодинамика

*Ксилометазолин* — местное сосудосуживающее средство (деконгестант) с альфа-адреномиметической активностью, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки полости носа, восстанавливает проходимость носовых ходов, устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Действие ксилометазолина обычно наступает через несколько минут после его применения и продолжается до 10 ч.

*Декспантенол* — витамин группы В, производное пантотеновой кислоты.

Декспантенол превращается в организме в пантотеновую кислоту, являющуюся составной частью коэнзима А (КоА), и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов, стимулирует восстановление кожи и слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

### Фармакокинетика

*Ксилометазолин* при местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

*Декспантенол* при местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови - 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови - 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизменном виде.

## Показания к применению:

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита; острый аллергический ринит; вазомоторный ринит; синусит; средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой носоглотки); для облегчения проведения риноскопии; для восстановления нарушенного носового дыхания после хирургических вмешательств в носовой полости.

## Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Отит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

## Противопоказания:

Артериальная гипертензия; тахикардия; выраженный атеросклероз; атрофический ринит; гипертиреоз; порфирия; гиперплазия предстательной железы; глаукома; хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе); детский возраст до 2 лет; детский возраст до 6 лет (для лекарственных форм, предназначенных для детей более старшего возраста и взрослых); одновременная терапия ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами; повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

*С осторожностью*

Сахарный диабет, феохромоцитома.

## Способ применения и дозы:

Для интраназального применения. Применяют 3-4 раза/сут. Продолжительность лечения - 3-5 дней.

## Побочное действие:

*При частом и/или длительном применении:* раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чихание, гиперсекреция, аллергические реакции, отек слизистой оболочки носа, рвота, головная боль, сухой ринит, ощущение сердцебиения, повышение АД, бессонница, нарушение зрения, депрессия (при длительном применении высоких доз).

## Передозировка:

*Симптомы:* мидриаз, тошнота, рвота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, нарушение ритма сердца, сосудистая недостаточность, остановка сердца, повышение АД, отек легких, нарушение функции дыхания, галлюцинации. У пациентов также могут появиться симптомы угнетения со стороны ЦНС, сопровождающиеся сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, шоком, остановкой дыхания и комой.

*Лечение:* промывание желудка, прием энтеросорбентов (активированный уголь), кислородная вентиляция легких. С целью снижения АД применяют 5 мг фентоламина в 0,9% растворе натрия хлорида путем медленного в/в введения или назначение 100 мг фентоламина внутрь. Сосудосуживающие ЛС противопоказаны. При необходимости применяют жаропонижающие и противосудорожные средства.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) применение не рекомендуется.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении ингибиторов MAO и трициклических антидепрессантов возможно усиление системного действия.

## Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Не следует применять более 5 дней.

*Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами*

В период применения следует соблюдать меры предосторожности, либо избегать управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/SeptaNazal>