

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Содержащиеся в препарате Септолете бензалкония хлорид и тимол обладают антисептическими свойствами, активны в отношении грамположительных бактерий, оказывают фунгицидное действие на *Candida albicans* и некоторые липофильные вирусы.

Ментол и эфирное масло мяты перечной обладают умеренным обезболивающим и дезодорирующим действием.

Эфирное масло эвкалипта уменьшает секрецию слизи в верхних отделах дыхательных путей и облегчает дыхание.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- фарингиты, ларингиты, тонзиллит;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4-х лет;
- дефицит фермента лактазы, галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы, дефицит фермента изомальтазы, врожденная непереносимость фруктозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Медленно рассасывать (до полного растворения) в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 ч.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать до 8 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 4 лет рекомендуется принимать до 4 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 10 лет рекомендуется принимать до 6 пастилок/сут.

Не следует принимать пастилки непосредственно перед приемом пищи и вместе с молоком.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.

Прочие: возможны аллергические реакции (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

Передозировка:

Возможность передозировки минимальна.

Симптомы: тошнота, рвота и диарея.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что в каждой пастилке содержится 174.5 мг сахара (сахароза, глюкоза).

Рекомендуется воздерживаться от одновременного приема Септолете с молоком, т.к. молоко снижает антисептическую активность бензалкония хлорида.

В 1 пастилке содержится 218 мг лактозы, 623.575 мг сахарозы, 152.7 мг сорбитола, поэтому препарат не следует принимать пациентам с дефицитом лактазы, дефицитом сахаразы/изомальтазы, галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы или врожденной непереносимостью фруктозы, т.к. это может вызвать нарушения пищеварения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пастилки не оказывают воздействия на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Septolete>