
Септолете



Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бензалкония хлорид
- Левоментол
- Мяты перечной листьев масло
- Тимол
- Эвкалипта прутовидного листьев масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Пастилки*** светло-зеленого цвета, с возможными вкраплениями белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 пастилка
бензалкония хлорид	1 мг
левоментол	1.2 мг
масло мяты перечной	1 мг
масло эвкалиптовое	0.6 мг
тимол	0.6 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, парафин жидкий, глицерол, касторовое масло, пеногаситель 1510, сорбитол, декстроза (глюкоза) жидкая (сухое вещество), магния стеарат, краситель хинолиновый желтый (Е104), индигокармин синий краситель (Е132), титана диоксид (Е171), повидон, воск эмульсионный, сахароза.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Содержащиеся в препарате Септолете бензалкония хлорид и тимол обладают антисептическими свойствами, активны в отношении грамположительных бактерий, оказывают фунгицидное действие на Candida albicans и некоторые липофильные вирусы.

Ментол и эфирное масло мяты перечной обладают умеренным обезболивающим и дезодорирующим действием.

Эфирное масло эвкалипта уменьшает секрецию слизи в верхних отделах дыхательных путей и облегчает дыхание.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

— фарингиты, ларингиты, тонзиллит;

— воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Относится к болезням:

- Воспаление
- Гингивит
- Ларингит
- Стоматит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— детский возраст до 4-х лет;

— дефицит фермента лактазы, галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы, дефицит фермента изомальтазы, врожденная непереносимость фруктозы;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Медленно рассасывать (до полного растворения) в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 ч.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать до 8 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 4 лет рекомендуется принимать до 4 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 10 лет рекомендуется принимать до 6 пастилок/сут.

Не следует принимать пастилки непосредственно перед приемом пищи и вместе с молоком.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, диарея.

Прочие: возможны аллергические реакции (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

Передозировка:

Возможность передозировки минимальна.

Симптомы: тошнота, рвота и диарея.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что в каждой пастилке содержится 174.5 мг сахара (сахароза, глюкоза).

Рекомендуется воздерживаться от одновременного приема Септолете с молоком, т.к. молоко снижает антисептическую активность бензалкония хлорида.

В 1 пастилке содержится 218 мг лактозы, 623.575 мг сахарозы, 152.7 мг сорбитола, поэтому препарат не следует принимать пациентам с дефицитом лактазы, дефицитом сахаразы/изомальтазы, галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы/галактозы или врожденной непереносимостью фруктозы, т.к. это может вызвать нарушения пищеварения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пастилки не оказывают воздействия на способность управлять автомобилем и другими механическими средствами.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Septolete