

Септолете Д



Код АТХ:

- [R02AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензалкония хлорид](#)
- [Левоментол](#)
- [Мяты перечной листьев масло](#)
- [Тимол](#)
- [Эвкалипта прутовидного листьев масло](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [Википедия](#)^{мнн} [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#) [мнн](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Пастилки без сахара** круглые, двояковыпуклые, желтого цвета.

	1 пастилка
бензалкония хлорид	1 мг
левоментол	1.2 мг
масло мяты перечной	1 мг
масло листьев эвкалипта	600 мкг
тимол	600 мкг

Вспомогательные вещества: мальтитол жидкий, маннитол, масло касторовое, глицерол, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, повидон, краситель хинолиновый желтый (E104), титана диоксид (E171), воск эмульсионный, мальтитол.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Септолете Д представляет собой комбинацию антисептика из группы четвертичных соединений аммония (бензалкония хлорид) и активных природных веществ (ментол, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло эвкалипта, тимол), которые увеличивают активность антисептика и улучшают его вкус.

Септолете Д

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Бензалкония хлорид оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, фунгицидное действие на *Candida albicans*, а также обладает некоторой противовирусной активностью в отношении липофильных вирусов.

Ментол и эфирное масло мяты перечной обладают умеренным обезболивающим и дезодорирующим действием. Пастилки облегчают боль при глотании и субъективные ощущения дискомфорта, например, першение. Тимол обладает антисептическим действием, которое усиливает эффективность препарата. Эфирное масло эвкалипта уменьшает секрецию слизи в верхних отделах дыхательных путей и облегчает дыхание.

Септолете Д содержит полиолы (мальтитол и маннитол), не содержит сахара, что позволяет назначать препарат больным сахарным диабетом. Бессахарная среда увеличивает активность антисептического средства.

Мальтитол и маннитол метаболизируются бактериями ротовой полости очень медленно и в незначительной степени, поэтому не оказывают повреждающего действия на эмаль зубов.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, глотки и гортани:

- фарингит, ларингит, тонзиллит;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Относится к болезням:

- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- наследственная непереносимость фруктозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при сахарном диабете.

Способ применения и дозы:

Следует медленно рассасывать (до полного растворения) в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 ч.

Взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать не более 8 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 4 лет рекомендуется принимать не более 4 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 10 лет рекомендуется принимать не более 6 пастилок/сут.

Не следует принимать пастилки непосредственно перед приемом пищи, во время еды и вместе с молоком.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота, рвота, диарея.

Прочие: возможны аллергические реакции (у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата).

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота и диарея (обусловленные действием полиолов - мальтитола и маннитола, а также глицерола), головная боль (обусловленная действием глицерола).

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача.

Данные по применению Септолете Д при беременности и в период грудного вскармливания ограничены, поэтому нельзя полностью исключить риск для плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Бензалкония хлорид не рекомендуется применять с другими антисептиками, предназначенными для рассасывания в полости рта.

Рекомендуется воздерживаться от одновременного приема Септолете Д с молоком, т.к. молоко снижает антисептический эффект бензалкония хлорида.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Пастилки Септолете Д могут применять пациенты, имеющие противопоказания или ограничения в приеме сахаросодержащих препаратов.

Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что каждая пастилка содержит 0.95 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, но поскольку гидролиз и всасывание из ЖКТ происходят медленно, коррекция дозы гипогликемических препаратов не требуется. Энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2.4 ккал/г) существенно меньше, чем у сахарозы.

При более тяжелом течении заболевания, сопровождающемся повышением температуры, головной болью и рвотой пациент должен обратиться к врачу, особенно, если состояние не улучшается в течение 3 дней от начала терапии.

Пастилки Септолете Д содержат глицерол, который в высоких дозах может вызвать головную боль и желудочно-кишечные расстройства. Пастилки Септолете Д также содержат полиолы (мальтитол, маннитол), которые в высоких дозах могут вызвать диспепсические расстройства, особенно у детей.

Септолете Д содержит мальтитол, поэтому препарат не следует назначать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью фруктозы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных о том, что препарат Септолете Д оказывает влияние на способность к управлению автотранспортом и работе с механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Септолете Д

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Septolete_D