

Септолете Нео



Код АТХ:

- [R02AA06](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цетилпиридиния хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Пастилки яблочные** круглые, двояковыпуклые, зеленого цвета; допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

	1 пастилка
Цетилпиридиния хлорид моногидрат	1.26 мг,
соответствует цетилпиридиния хлориду	1.2 мг

Вспомогательные вещества: мальтитол жидкий (сухое вещество) - 476.64 мг, маннитол - 163.88 мг, левоментол - 2 мг, масло лимона - 3 мг, ароматизатор яблочный - 10 мг, краситель желтый (E100) (краситель куркумин (E100), лимонная кислота, натрия бензоат, сахароза, вода, камедь акации) - 0.65 мг, краситель зеленый (E141) (краситель хлорофилл медный (E141), лимонная кислота, желатин, сахароза, вода) - 1.95 мг, глицерол - 3.5 мг, масло касторовое - 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1 мг, магния стеарат - 3 мг, титана диоксид (E171) - 3 мг, повидон - 2.5 мг, капот 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) - 2.5 мг, мальтитол - до 1200 мг.

9 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Пастилки лимонные** круглые, двояковыпуклые, желтого цвета; допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

	1 пастилка
Цетилпиридиния хлорид моногидрат	1.26 мг,
соответствует цетилпиридиния хлориду	1.2 мг

Вспомогательные вещества: мальтитол жидкий (сухое вещество) - 476.64 мг, маннитол - 163.88 мг, левоментол - 2 мг, масло лимона - 3 мг, ароматизатор лимонный - 3 мг, ароматизатор цитрусовый - 3 мг, масло апельсина - 4 мг, краситель желтый (E100) (краситель куркумин (E100), лимонная кислота, натрия бензоат, сахароза, вода, камедь акации) - 2.6 мг, глицерол - 3.5 мг, масло касторовое - 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1 мг, магния стеарат - 3 мг, титана диоксид (E171) - 3 мг, повидон - 2.5 мг, капот 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) - 2.5 мг, мальтитол - до 1200 мг.

9 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Пастилки черешневые** круглые, двояковыпуклые, от розового до розового с сиреневым оттенком цвета, допускается наличие незначительных вкраплений более светлого цвета.

	1 пастилка
Цетилпиридиния хлорид моногидрат	1.26 мг,

Септолете Нео

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

соответствует цетилпиридиния хлориду	1.2 мг
--------------------------------------	--------

Вспомогательные вещества: мальтитол жидкий (сухое вещество) - 476.64 мг, маннитол - 163.88 мг, левоментол - 2 мг, масло лимона - 3 мг, ароматизатор черешневый - 10 мг, краситель фиолетовый (E120) (карминовая кислота (E120), раствор натрия гидроксида, лимонная кислота) - 2.6 мг, глицерол - 3.5 мг, масло касторовое - 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 1 мг, магния стеарат - 3 мг, титана диоксид (E171) - 3 мг, повидон - 2.5 мг, капот 600 фарма (воск пчелиный, воск карнаубский, шеллак) - 2.5 мг, мальтитол - до 1200 мг.

9 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Цетилпиридиния хлорид - антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений, обладает противомикробным, противогрибковым и вирулицидным действием.

Фармакокинетика

Четвертичные аммониевые соединения, к которым относится цетилпиридиния хлорид, всасываются только на 10-20%. Не всосавшаяся часть выводится через кишечник в неизменном виде.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- фарингит, ларингит, начальная стадия ангины;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Пастилку следует рассасывать в полости рта до полного растворения. Пастилки не следует принимать непосредственно перед или во время приема пищи.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется принимать пастилки каждые 2-3 ч, но не более 8 пастилок/сут.

Детям в возрасте старше 4 лет рекомендуется принимать пастилки каждые 3-4 ч, но не более 4 пастилок/сут.

Детям в возрасте от 10 до 12 лет рекомендуется принимать пастилки каждые 3-4 ч, но не более 6 пастилок/сут.

Побочное действие:

Септолете Нео

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Побочные эффекты наблюдаются редко, если принимать таблетки Септолете Нео в рекомендованных дозах.

Возможно: аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея), при проявлении которых применение препарата следует прекратить.

Препарат содержит полиолы (мальтитол, маннитол), которые могут в больших дозах вызвать диарею, особенно у детей.

Передозировка:

Учитывая количество активного вещества, содержащегося в 1 таблетке, возможность передозировки минимальная.

Симптомы: при превышении рекомендуемых доз - нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота и диарея).

Лечение: следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Септолете Нео следует с осторожностью применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Таблетки не следует принимать с молоком, поскольку возможно снижение противомикробной активности цетилпиридиния хлорида.

Особые указания и меры предосторожности:

Таблетки не следует принимать при наличии открытых ран в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.

При тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой, головной болью и рвотой, следует проконсультироваться у врача, особенно если состояние не улучшается в течение 3 дней.

Пациентов с сахарным диабетом следует информировать о том, что в 1 таблетке содержится около 1 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, но из-за медленного гидролиза и всасывания в ЖКТ гликемический индекс низкий. Энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2.4 ккал/г) также значительно ниже, чем у сахарозы.

Не следует принимать более высокие дозы, чем рекомендуется.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Таблетки не оказывают воздействия на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан к применению в детском возрасте до 4 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Септолете Нео

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Septolete_Neo