

Септолете плюс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бензокаин](#)
- [Цетилпиридиния хлорид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Пастилки**, покрытые оболочкой голубого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью.

	1 пастилка
бензокаин	5 мг
цетилпиридиния хлорид (в форме моногидрата)	1 мг

Вспомогательные вещества: левоментол, масло листьев мяты перечной, мальтитол жидкий (сухое вещество), маннитол, глицерол, масло касторовое, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, краситель синий патентованный V (E131), титана диоксид (E171), воск эмульсионный (Капол 600 Фарма), повидон, мальтитол.

9 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

◇ **Пастилки медово-лаймовые**, покрытые оболочкой темно-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью.

	1 пастилка
бензокаин	5 мг
цетилпиридиния хлорид (в форме моногидрата)	1 мг

Вспомогательные вещества: левоментол - 3 мг, масло листьев мяты перечной - 1 мг, ароматизатор лаймовый - 25 мг, ароматизатор медовый - 15 мг, мальтитол жидкий (сухое вещество) - 478 мг, маннитол - 167.5 мг, глицерол - 3.5 мг, масло касторовое - 1.1 мг, кремния диоксид коллоидный - 1 мг, магния стеарат - 10 мг, капол 600 Фарма - 2.5 мг, повидон - 2.5 мг, титана диоксид (E171) - 4 мг, краситель хинолиновый желтый (E104) - 0.75 мг, краситель карамель (E150a) - 0.06 мг, краситель красный очаровательный (E129) - 0.01 мг, мальтитол - до 1250 мг.

9 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии.

Препарат Септолете плюс обладает местноанестезирующим и противомикробным действием. Препарат содержит антисептическое средство цетилпиридиния хлорид, который обладает противомикробным, противогрибковым и вирулицидным действием.

Бензокаин является местным анестезирующим средством, уменьшает боль при глотании, которая часто сопровождается инфекционно-воспалительными процессами полости рта и горла.

Септолете плюс содержит полиолы (в т.ч. мальтитол, маннитол), не содержит сахара, что позволяет принимать препарат пациентам с сахарным диабетом. Бессахарная среда увеличивает активность антисептического средства.

Фармакокинетика

Четвертичные аммониевые соединения, к которым относится цетилпиридиния хлорид, всасываются только на 10-20%. Не всосавшаяся часть выводится через кишечник в неизменном виде.

Бензокаин плохо растворим в воде, что определяет его минимальную абсорбцию. Абсорбированный бензокаин гидролизуется преимущественно плазменной холинэстеразой, небольшая часть метаболизируется в печени. Метаболиты выводятся почками.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла:

- фарингит, ларингит, начальная стадия ангины;
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Воспаление](#)
- [Гингивит](#)
- [Ларингит](#)
- [Стоматит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 6 лет;
- наследственная непереносимость фруктозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при сахарном диабете, открытых ранах ротовой полости (т.к. цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран).

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет рекомендуется рассасывать по 1 пастилке каждые 2-3 ч, но не более 8 пастилок/сут.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет рекомендуется рассасывать по 1 пастилке каждые 4 ч, но не более 4 пастилок/сут.

Септолете плюс не следует принимать непосредственно перед приемом пищи и одновременно с молоком.

Побочное действие:

Септолете плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Со стороны пищеварительной системы: очень редко - тошнота, диарея, при проявлении которых прием препарата должен быть прекращен.

Препарат содержит полиолы (мальтитол, маннитол), которые в высоких дозах могут вызвать диарею, особенно у детей.

Прочие: очень редко - аллергические реакции.

Передозировка:

Учитывая количество активных веществ, содержащихся в 1 таблетке, возможность передозировки минимальная.

Симптомы: при превышении рекомендуемых доз возможны нарушения со стороны ЖКТ (тошнота, рвота и диарея). Бензокаин в высоких дозах может вызвать метгемоглобинемию, а цетилпиридиния хлорид - рвоту и тошноту.

Лечение: пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные по применению Септолете плюс при беременности и в период грудного вскармливания ограничены, поэтому беременным и кормящим женщинам принимать препарат не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано случаев взаимодействия Септолете плюс с другими лекарственными препаратами.

Одновременный прием Септолете плюс с пищей и молоком может снизить местный антисептический и анестезирующий эффекты препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

Пациенты с сахарным диабетом должны знать о том, что в 1 таблетке содержится приблизительно 1 г мальтитола, для метаболизма которого необходим инсулин. Из-за медленного гидролиза и плохого всасывания из ЖКТ мальтитол влияет на концентрацию глюкозы в плазме незначительно. Поэтому коррекция дозы гипогликемических препаратов не требуется. Энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г или 2.4 ккал/г) существенно ниже, чем у сахарозы.

При более выраженных инфекционных процессах, сопровождающихся повышением температуры, головной болью и рвотой, необходимо обратиться к врачу, особенно если состояние не улучшается в течение 3 дней от начала терапии.

Септолете плюс содержит мальтитол, поэтому препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью фруктозы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных о том, что препарат Септолете плюс оказывает воздействие на способность управлять автомобилем и сложными механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не принимать после истечения срока годности.

Срок годности:

Септолете плюс

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Septolete_plyus