Шалфей



Код АТХ:

- A01AD11

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания в блистере 10 шт, в пачке картонной 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров.

Пастилки в блистере 2, 4, 6, 8, 10 или 12 шт, в пачке картонной 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров.

Состав:

Одна таблетка для рассасывания содержит

Активные вещества: шалфея экстракт сухой 12,5 мг, шалфея масло эссенциальное 2,4 мг

Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота; яблочная кислота; сорбит; аспартам; магния стеарат; кремния диоксид коллоидный; ароматизатор медовый; хинолиновый желтый Е-104; индигокармин Е-132

Одна пастилка содержит

Активные вещества: шалфея экстракт сухой 12,5 мг, шалфея масло эссенциальное 2,4 мг

Вспомогательные вещества: декстроза жидкая; сахароза; лимонная кислота; ароматизатор масляный экстракт шалфея; вода очищенная.

Описание:

Таблетки для рассасывания: плоские, со скошенным краем, голубовато-зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом; на обеих сторонах таблетки гравировка "NP" на фоне изображения дерева.

Пастилки: плоские, круглые, со скошенным краем, с шероховатой поверхностью, от светло-желтого до зеленовато-

желтого цвета, со специфическим запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, отхаркивающее действие. Обладает вяжущими свойствами.

Показания к применению:

Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и полости рта:

— ангины;

— ларингиты;

— фарингиты;

— стоматиты;

— гингивиты.

Относится к болезням:

- Ангина
- Гингивит
- Ларингит
- Стоматит
- Фарингит

Противопоказания:

Шалфей не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 5 лет;

— острый нефрит.

С осторожностью: сахарный диабет (для пастилок).

Способ применения и дозы:

Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым и подросткам старше 15 лет — по 6 табл. или пастилок в день с интервалом в 2 ч.

Детям с 10 до 15 лет — по 4 табл. или пастилки в день с интервалом 3 ч.

Детям с 5 до 10 лет — по 3 табл. или пастилки в день с интервалом 4 ч.

Длительность терапии — 5–7 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Больным диабетом следует учитывать, что в 1 пастилке содержится 2,4 г сахара, что соответствует 0,2 ХЕ.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Shalfey