

## [Шигеллвак](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Раствор липосахарида, извлеченный из культуры *Shigella sonnei*, очищенный ферментативными и физико-химическими методами.

Формирует специфическую устойчивость к *Shigella sonnei*, стимулирует появление специфических антител, обеспечивающих через 2-3 нед невосприимчивость к инфекции в течение 1 года.

### **Показания к применению:**

— дизентерия Зонне (профилактика).

### **Относится к болезням:**

- [Дизентерия](#)

### **Противопоказания:**

— гиперчувствительность (в т.ч. на предшествующее введение дизентерийной вакцины);  
— острый период инфекционных и неинфекционных заболеваний;  
— обострения хронических заболеваний;  
— период реконвалесценции или ремиссии в течение 1 мес после острого периода заболевания;  
— беременность;  
— детский возраст (до 3 лет).

### **Способ применения и дозы:**

**Взрослым и детям в возрасте от 3 лет и старше** препарат вводят п/к (глубоко) или в/м в наружную поверхность

верхней трети плеча - по 50 мкг (0.5 мл) однократно. При необходимости ежегодно проводят ревакцинацию в той же дозе.

Вскрытие ампул и процедуру введения препарата осуществляют при строгом соблюдении правил асептики и антисептики. Препарат из вскрытой ампулы должен быть использован немедленно.

Проведенную прививку регистрируют в установленных учетных формах с указанием наименования препарата и даты прививки, дозы, предприятия-изготовителя, номера серии и реакции на прививку.

### **Побочное действие:**

Редко (в течение первых суток после иммунизации) - гипертермия (в 3-5% случаев - субфибрилитет в течение 24-48 ч), головная боль, местные реакции (гиперемия, болезненность в месте инъекции).

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата противопоказано при беременности.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Вакцинацию можно проводить в один день с другими профилактическими прививками инактивированными препаратами или с интервалом после последней прививки не менее 1 мес.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Профилактическая вакцинация рекомендуется для работников инфекционных стационаров и бактериологических лабораторий; лиц, занятых в сфере общественного питания и коммунального благоустройства; детей, посещающих детские учреждения и отезжающих в оздоровительный лагерь; лиц, отезжающих в регионы с высоким уровнем заболеваемости дизентерией зоне; перед сезонным подъемом уровня заболеваемости этой инфекцией.

По эпидемиологическим показаниям прививки проводят при эпидемии или угрозе ее возникновения (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводных и канализационных сетях).

С целью выявления противопоказаний в день прививки следует собрать полный анамнез заболеваний и провести термометрию, при необходимости проводят необходимые лабораторные исследования.

Перед вакцинацией оценивают целостность ампулы и упаковки, состояние физических свойств препарата, проверяют срок его годности.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 3 лет.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Shigellvak>