Сибектан



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Березы листьев экстракт
- Зверобоя продырявленного травы экстракт
- Расторопши пятнистой плодов экстракт
- Пижмы обыкновенной цветков экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН МНН МНН МНН] Википедия[МНН МНН МНН МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** круглые, двояковыпуклой формы, от серовато-зеленого до темно-серого или серовато-коричневого цвета с вкраплениями.

	1 таб.
сухой экстракт цветков пижмы обыкновенной (сухой экстракт танацехол*)	25 мг
сухой экстракт плодов расторопши пятнистой (сухой экстракт силимар**)	30 мг
сухой экстракт зверобоя***	25 мг
сухой экстракт березы****	20 мг

Вспомогательные вещества: лактоза (сахар молочный), крахмал картофельный сорт "экстра", кремния диоксид коллоидный (аэросил А-380), кальция стеарат (кальций стеариновокислый), кроскармеллоза натрия.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

* - с содержанием суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в пересчете на лютеолин и абсолютно сухое вещество 55%
** - с содержанием суммы флаволигнанов в пересчете на силибин и абсолютно сухое вещество 65%
*** - с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно сухое вещество 8%
**** - с содержанием фенольных соединений в пересчете на рутин и абсолютно сухое вещество 5%

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротектор растительного происхождения. Оказывает гепатопротекторное, мембраностабилизирующее,

антиоксидантное и желчегонное действие.

Показания к применению:

В качестве гепатопротекторного средства при:

— хроническом персистирующем гепатите;

— хроническом холецистите;

— гипомоторной дискинезии желчного пузыря.

В составе комплексной терапии:

— цирроза печени;

— жировой дистрофии печени алкогольного генеза.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— холелитиаз;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым препарат назначают по 2 таб. 4 раза/сут. Курс лечения составляет 20-25 дней. При необходимости терапия может быть продолжена в течение еще 10-15 дней.

Таблетки принимают за 20-40 мин до еды.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени случаев передозировки препарата Сибектан не выявлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Сибектан не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Возможно применение по показаниям

Применение в детском возрасте

Препарат не рекомендуется назначать **детям в возрасте до 12 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Sibektan