Сиэль



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Блокатор гистаминовых H_1 -рецепторов с антихолинергическими свойствами. Уменьшает или устраняет вызываемые гистамином повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки, увеличение проницаемости капилляров с развитием отека, гиперемию и зуд. Дименгидринат оказывает выраженное седативное и противорвотное действие.

Показания к применению:

Профилактика и симптоматическое лечение тошноты, рвоты и головокружения различного генеза (в т.ч. при болезни Меньера, кинетозах).

Относится к болезням:

- Головокружение
- Тошнота

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к дименгидринату, детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы:

У взрослых применяют в дозе 50-100 мг 4-6 раз/сут. Максимальная суточная доза - 400 мг.

У детей в возрасте 1-6 лет применяют в дозе 12.5-25 мг 2-3 раза/сут, 7-12 лет - 25-50 мг 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Возможно: сухость во рту, нарушение аккомодации, сонливость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) дименгидринат применяют с осторожностью, только в случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск проявления побочных действий у плода или ребенка.

В экспериментальных исследованиях установлено, что дименгидринат вызывает развитие кардиоваскулярных дефектов и паховой грыжи у плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с седативными, снотворными средствами, антидепрессантами, этанолом усиливается угнетающее влияние на ЦНС.

При одновременном применении дименгидринат может маскировать ототоксичность стрептомицина и, по-видимому, других антибиотиков группы аминогликозидов.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применяют дименгидринат при закрытоугольной глаукоме, нарушениях мочеиспускания, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, эпилепсией, у больных с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В период лечения следует избегать употребления алкоголя.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, принимающим дименгидринат, следует избегать занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Siel