

## Сигида Дуо



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Капли глазные** в виде прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной жидкости.

	<b>1 мл</b>
дифенгидрамина гидрохлорид	1 мг
нафазолин (в форме нитрата)	0.33 мг

Вспомогательные вещества: борная кислота - 16 мг, макрогол 300 - 1.125 мг, натрия гиалуронат - 1 мг, динатрия эдетата дигидрат (трилон Б) - 0.5 мг, натрия гидроксид раствор 1M или азотной кислоты 0.1M раствор - до pH 4.0-7.0, вода д/и - до 1 мл.

0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (2) - пачки картонные.  
0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (4) - пачки картонные.  
0.4 мл - тьюбики-капельницы (5) - пакеты (6) - пачки картонные.  
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (1) - пачки картонные.  
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (2) - пачки картонные.  
0.4 мл - тьюбики-капельницы (10) - пакеты (3) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное лекарственное средство для местного применения в офтальмологии.

**Дифенгидрамин** - блокатор гистаминовых H<sub>1</sub>-рецепторов, оказывает противоаллергическое действие. Уменьшает отек, зуд, слезотечение.

**Нафазолин** - альфа-адреномиметик, вызывает длительное сужение периферических сосудов. Благодаря сосудосуживающему действию при местном применении оказывает противоотечное действие.

### Показания к применению:

Острый аллергический конъюнктивит (в т.ч. поллинозный конъюнктивит); конъюнктивит при лекарственной аллергии; инфекционные заболевания глаз с острым аллергическим компонентом (в качестве дополнительного средства).

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Инфекции](#)
- [Конъюнктивит](#)
- [Поллиноз](#)

## Противопоказания:

Хсероз конъюнктивы (сухой кератоконъюнктивит, синдром Шегрена); одновременное применение с ингибиторами MAO и период в течение 10 дней после их отмены; закрытоугольная глаукома; беременность, период лактации (грудного вскармливания); детский возраст до 2 лет; повышенная чувствительность к активными веществам.

*С осторожностью*

Тиреотоксикоз, артериальная гипертензия, атеросклероз, аритмия, хронический ринит, бронхиальная астма, аденома надпочечников, у пациентов пожилого возраста, доброкачественная гиперплазия предстательной железы с наличием остаточной мочи.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** при *острых симптомах* - по 1 капле в конъюнктивальный мешок каждые 3 ч до уменьшения отека и раздражения глаз, затем - по 1 капле 2-3 раза/сут до исчезновения клинических симптомов.

**Детям старше 2 лет** - 1-2 капли/сут.

Продолжительность лечения - не более 5 дней. Необходимость более длительного применения врач решает индивидуально.

При сохранении симптомов раздражения конъюнктивы более 72 ч следует прекратить применение данной комбинации.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* симптомы раздражения конъюнктивы (жжение в области глаз, гиперемия конъюнктивы, зуд), а также нарушение зрения, повышение внутриглазного давления, мидриаз, боль в глазах, сухость слизистой оболочки носа. Эти реакции исчезают после отмены препарата. Описан единичный случай помутнения роговицы (при применении в течение 7 дней не менее 10 раз/сут), которое исчезло после прекращения лечения препаратом.

*Системные реакции:* редко (особенно у детей и пациентов пожилого возраста) - бледность кожных покровов, тахикардия, боли в области сердца, повышение АД, усиление потоотделения, дрожь, головная боль, возбуждение, тошнота, сонливость, головокружение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) противопоказано.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Диагнозы

- Анафилактический шок
- Отек Квинке
- Сенная лихорадка

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять чаще, чем через каждые 3 ч (в течение 5 дней).

В случае появления симптомов, свидетельствующих о системном всасывании, необходимо прекратить применение.

*Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами*

Поскольку после инстиляции временно нарушается четкость зрения, сразу после применения лекарственного средства пациентам следует воздерживаться от вождения автотранспорта и деятельности, требующей четкости зрения.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Sigida\\_Duo](http://drugs.thead.ru/Sigida_Duo)