Силимар



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** двояковыпуклой или плоскоцилиндрической формы, с фаской, от светло-коричневого до коричневого цвета, с вкраплениями.

	1 таб.
экстракт плодов расторопши пятнистой	100 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

10 шт. - упаковки безъячейковые контурные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные.
50 шт. - упаковки ячейковые контурные.
30 шт. - банки темного стекла.
30 шт. - пеналы полистероловые.
60 шт. - пеналы полистероловые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротекторный препарат растительного происхождения. Обладает гепатопротекторным и антитоксическим действием. Лечебный эффект обусловлен влиянием на метаболизм гепатоцитов. Активирует синтез белков и ферментов в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану гепатоцитов, тормозит проникновение токсинов в клетки печени, ингибирует дистрофические и потенцирует регенеративные процессы в печени.

Показания к применению:

— токсические повреждения печени;

— хронический гепатит;

— цирроз печени (в составе комплексной терапии);

— состояние после перенесенного гепатита;

— с целью профилактики при хронических интоксикациях (в т.ч. профессиональных), длительном приеме лекарственных средств и алкоголя.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Интоксикация
- Токсическое повреждение печени

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь **взрослым** по 1-2 таб. 3 раза/сут. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости курс повторяют через 1-3 месяца.

Препарат принимают за 30 мин до приема пищи.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

В отдельных случаях: послабляющее действие.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Силимар не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Силимар не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 12 лет**.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Silimar