

Силимар



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки** двояковыпуклой или плоскоцилиндрической формы, с фаской, от светло-коричневого до коричневого цвета, с вкраплениями.

	1 таб.
экстракт плодов расторопши пятнистой	100 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал картофельный, магния стеарат.

- 10 шт. - упаковки безъячейковые контурные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные.
- 30 шт. - упаковки ячейковые контурные.
- 50 шт. - упаковки ячейковые контурные.
- 30 шт. - банки темного стекла.
- 30 шт. - пеналы полистероловые.
- 60 шт. - пеналы полистероловые.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гепатопротекторный препарат растительного происхождения. Обладает гепатопротекторным и антитоксическим действием. Лечебный эффект обусловлен влиянием на метаболизм гепатоцитов. Активирует синтез белков и ферментов в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану гепатоцитов, тормозит проникновение токсинов в клетки печени, ингибирует дистрофические и потенцирует регенеративные процессы в печени.

Показания к применению:

- токсические повреждения печени;
- хронический гепатит;
- цирроз печени (в составе комплексной терапии);
- состояние после перенесенного гепатита;
- с целью профилактики при хронических интоксикациях (в т.ч. профессиональных), длительном приеме лекарственных средств и алкоголя.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Интоксикация](#)
- [Токсическое повреждение печени](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь **взрослым** по 1-2 таб. 3 раза/сут. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости курс повторяют через 1-3 месяца.

Препарат принимают за 30 мин до приема пищи.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

В отдельных случаях: послабляющее действие.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Силимар не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Силимар не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 12 лет**.

Условия хранения:

Силимар

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Silimar>