Силимарина СЕДИКО



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Расторопши пятнистой плодов экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Относится к группе гепатопротекторов. Препятствует разрушению клеточных мембран, что обусловлено способностью ингибировать перекисное окисление липидов. Стимулирует синтез белка и фосфолипидов в поврежденных гепатоцитах, в результате этого происходит стабилизация клеточных мембран, предотвращается потеря компонентов клетки. Препятствует проникновению в клетку некоторых гепатотоксических веществ (в частности, ядов гриба бледной поганки).

Фармакокинетика

При приеме внутрь абсорбция из ЖКТ низкая и медленная (период полуабсорбции - 2.2 ч), метаболизируется в печени путем конъюгации, $T_{1/2}$ - 6 ч. Выводится преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулирует в организме. После многократного приема внутрь по 140 мг 3 раза/сут достигается стабильное содержание выделения с желчью. Имеет место энтеропеченочная циркуляция.

Показания к применению:

Токсические повреждения печени, хронический гепатит, цирроз печени (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Цирроз печени

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к силибинину.

Способ применения и дозы:

Устанавливают индивидуально. Взрослым назначают по 70-140 мг 2-3 раза/сут, детям - по 30-100 мг 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: послабляющее действие, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации препарат назначают только по строгим показаниям и после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Silimarina_SEDIKO