

Сильведерм



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Аэрозоль 1% для наружного применения** в виде суспензии от белого до светло-желтого цвета с легким запахом лаванды.

	1 мл
сульфадиазин серебра	10 мг

Вспомогательные вещества: изопропила миристант, кремния диоксид коллоидный, лаванды эссенция 504, этанол, 1,1,1,2-тетрафторэтан (пропеллент 134a).

50 мл - баллоны алюминиевые (1) - пачки картонные.

♦ **Крем 1% для наружного применения** однородный, белого или почти белого цвета.

	1 г
сульфадиазин серебра	10 мг

Вспомогательные вещества: цетиловый спирт, стеариловый спирт, парафин твердый, цетиол V, эмульгин В-2, пропиленгликоль, метилпарабен, вода дистиллированная.

50 г - тубы пластиковые (1) - пачки картонные.

500 г - банки пластмассовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с антибактериальным действием для наружного применения, сульфаниламид.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода *Candida* и дерматофитов.

Бактерицидные свойства препарата обусловлены активностью ионов серебра, которые высвобождаются в ране в результате диссоциации сульфадиазина серебра; высвобождение ионов серебра происходит постепенно (умеренная диссоциация), обеспечивая постоянство антибактериального действия. Бактерицидная активность ионов серебра дополняется бактериостатическим действием сульфадиазина (также высвобождающегося в процессе диссоциации сульфадиазина серебра).

Крем характеризуется умеренной осмотической активностью и не обладает некролитическими свойствами.

Фармакокинетика

При нанесении крема на поврежденную поверхность кожи (ожоги или раны) возможна абсорбция активных веществ препарата - до 1% ионов серебра и до 10% сульфадиазина от общего количества нанесенной на рану серебряной

соли сульфадиазина.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гнойных ран и ожогов со слабовыраженной экссудацией, трофических язв, пролежней у взрослых и детей старше 1 года, в т.ч.:

- обработка свежих ожоговых поверхностей для профилактики инфекции;
- лечение раневых и ожоговых поверхностей в первой фазе раневого процесса со слабовыраженной экссудацией;
- лечение ран и ожогов I-IIIА степени во второй и третьей фазе раневого процесса;
- лечение трофических язв, пролежней, длительно незаживающих ран, в т.ч. ран культ.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Пролежни](#)

Противопоказания:

- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

Способ применения и дозы:

Крем или аэрозоль применяют наружно после хирургической обработки раны и удаления некротических тканей.

Крем наносят на поврежденную поверхность тонким слоем (2-4 мм) - под повязку или открытым способом.

Аэрозоль распыляют на поврежденную поверхность - под повязку или открытым способом.

Повязку меняют 1-2 раза/сут или реже. Длительность лечения - до 3 недель.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - жжение, боль (обычно проходят самостоятельно через 5-10 мин после наложения повязки).

Системные реакции: при длительном применении препарата на обширных ожоговых поверхностях возможны изменения картины периферической крови (лейкопения), диспептические симптомы и аллергические реакции, характерные для сульфаниламидных препаратов.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Сильведерм не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Сильведерм противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Сильведерм не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Сильведерм не следует применять для лечения глубоких гнойных ран и ожоговых поверхностей с обильной экссудацией.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 1 года.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Silvederm>